



# ພິດຜ້ກປ່າ ທີ່ນຳໃຊ້ເປັນອາຫານ ໃນ ສປປ ລາວ

(ເຫຼັມ 1)

**WILD EDIBLE PLANTS USE  
IN LAO PDR**  
**Volume 1**



ພະແນກນີ້ເວດວິທະຍາ  
ສະຖາບັນນີ້ເວດວິທະຍາ ແລະ ເຕັກໄນໂລຊີ ຊື່ວະພາບ  
ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໄນໂລຊີ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 2017



ພິດຜັກປ່າ ຫົ່ນໍາໃຊ້ເປັນອາຫານ ໃນ ສປປ ລາວ  
WILD EDIBLE PLANTS USE IN LAO PDR

ຄະນະຈັດທຳ: ສົມສະນິດ ບົວມະນີວົງ (ປທ.)  
ທັດສະພອນ ພະໄຊສົມບັດ (ປທ.)  
ພູຫົງ ໂພທີສັດ (ປຕ)  
ພະນັກງານພະແນກນີ້ເວດວິທະຍາ  
ສະຖາບັນນີ້ເວດວິທະຍາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຊຶ່ວະພາບ  
ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ

ຜູ້ກວດແກ້: ດຣ. ວິຈິດ ລຳໄຊ (ປອ.)

ທີ່ປຶກສາ: ລັດສະໜີ ພັນທະວົງ (ປທ.)  
ຄໍາ ນາມມືໄຊ (ປຕ)

ສະໜັບສະໜູນໂດຍ: ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ  
ສະຖາບັນນີ້ເວດວິທະຍາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຊຶ່ວະພາບ, ບ້ານ ດອນຕື້ວ,  
ເມືອງ ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ  
ເບີໂທລະສັບ: 021 732207; ແຟ້າ: 021 740630  
ວິປະມານສິ່ງເສີມການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດຂອງລັດຖະບານລາວ  
ສິກັບ 2012-13 (ໂຄງການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າພິດຜັກທີ່ໃຊ້ເປັນອາຫານ)


ພິມເຫັນ ທີ 1: ມີຖຸນາ, 2017



## ຄໍານຳ (Introduction)

ປະຊາຊົນລາວແຕ່ດີກດຳບັນຈົນເຖິງບັດຈຸບັນ ແມ່ນນຳໃຊ້ຂະນິດພັນພິດຜັກທີ່ມີໃນກຳມະຊາດໜີ ພິດຜັກປ່າ ເພື່ອລົງຊີບຕົນເອງ ກຳຄົດອບຄົວ ຊຶ່ງພິດຜັກເຫຼົ່ານັ້ນ ມັນໄດ້ໃຫ້ບັນດາທາດທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງຄົນເຮົາ ເຊັ່ນ: ໂປ່ຕິນ, ຄາໂບໄກເຮຸດ, ທາດເຫຼັກ, ແຄນຊູມ, ບັນດາວິຕາມິນ ແລະ ແຮ່ທາດຕ່າງໆ. ການກິນອາຫານທີ່ອຸດົມສົມບູນດ້ວຍພິດຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ ຈະຮັດໃຫ້ຄົນເຮົາມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ, ມີໝູມຕົ້ນທານທານ ແລະ ຫຼົງລົງການເປັນພະຍາດທີ່ວິຈ, ຫຼຸດເລືອດຕືບ, ໂລກອັວນ, ເບົາຫວານ ແລະ ຄວາມດັນເລືອດສູງ. ບັນດາພິດຜັກຕ່າງໆ ນອກຈາກມີປະໂຫຍດທາງດ້ານໂພສະນາການແລ້ວ ປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນ ຍັງນຳໃຊ້ພິດຜັກເລົ່ານັ້ນ ເຊົ້າໃນການເປັນປົວພະຍາດທີ່ພົບໃນຊຸມຊົນ ເຊັ່ນ: ປົວໄຂ, ທ້ອງຖອກ, ທ້ອງບົດ, ໄອ, ແກ້ເບື້ອ, ປົວຝີ, ບໍລຸງແມ່ຢູ່ກຳ, ແກ້ຜິດກຳ ແລະ ພະຍາດອື່ນໆ. ບັນດາຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ບັນທຶກໃນປິ້ມທົວນີ້ ເປັນການແນະນຳບັນດາທ່ານ ໃຫ້ຮູ້ຈັກກັບບາງຂະນິດພັນ ພິດຜັກປ່າ ແລະ ວິທີການນຳໃຊ້ ທີ່ໄດ້ສຶກສາ ແລະ ສໍາຫຼວດພົບໃນ 4 ແຂວງພາກໃຕ້ (ແຂວງ ອັດຕະປີ, ສາລະວັນ, ເຊກອງ, ຈຳປາສັກ), 5 ແຂວງພາກກາງຂອງລາວ (ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ, ຄຳມ່ວນ, ບໍລິຄ່າໄຊ, ວຽງຈັນ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ) ແລະ 2 ແຂວງພາກເໝືອ (ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ, ຫຼວງພະບາງ) ຂຶ້ງມັນໄດ້ຂຶ້ນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມອຸດົມສົມບູນ ຂອງການນຳໃຊ້ພິດຜັກປ່າໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານຊີວະນາງພັນພິດ ທີ່ເປັນປະໂຫຍດທາງດ້ານໂພສະນາການ. ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າໃນຕັ້ງນີ້ ແມ່ນຈຸດປະສົງ ເພື່ອສົ່ງເສີມການອະນຸລັກ ແລະ ນຳໃຊ້ ພິດຜັກປ່າໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ, ຮັກສາໄວ້ພູມບັນຍາທ້ອງຖິ່ນກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ພິດຜັກປ່າ ແລະ ສ້າງເປັນຖານຂໍ້ມູນໄວ້ ໃຫ້ບັນດາລູກຫຼານໄດ້ນຳໃຊ້ຕໍ່ໄປ.

ຂໍ້ມູນໃນປິ້ມເຫຼັ້ມນີ້ ແມ່ນໄດ້ສໍາພາດ ແລະ ເນັ້ນກຳຂໍ້ມູນຈາກປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ ໃນບາງເຂດ ແລະ ບາງເມືອງຂອງແຂວງ ອາດຈະເປັນຂໍ້ມູນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ພວກທ່ານ ກ່ຽວກັບພິດຜັກປ່າ ທີ່ນຳໃຊ້ເປັນອາຫານໃນ ສປປ ລາວ ເພື່ອສົ່ງເສີມການອະນຸລັກໄວ້ພູມບັນຍາທ້ອງຖິ່ນ, ເປັນຂໍ້ມູນນຳໃຊ້ ເຊົ້າໃນແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ ດ້ວມການຄ້າປະວັນດ້ານສະບູງອາຫານ ແລະ ເປັນຂໍ້ມູນຕໍ່ຍອດໃຫ້ແກ່ການສຶກສາຕົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາການປູກ. ບັນດາຂໍ້ມູນທາງຢ່າງໃນປິ້ມທົວນີ້ ອາດຈະຂາດຕິກຳປັ້ງຜ່ອງ, ບໍ່ຄົບຖ້ວນສົມບູນ ພວກຂ້າພະເຈົ້າ ຂໍຮັບເອົາຄໍາຕໍ່ນິຕິຊົມ ແລະ ຄໍາຄົດເຫັນຂອງທ່ານຜູ້ອ່ານ ເພື່ອຊ່ວຍປະກອບສ່ວນໃນການຈັດພິມເຫຼັ້ມຕໍ່ໄປ.



## ສາລະບານ (Content)

ເນື້ອໃນ	ຫຼັງຈາກ
ຄໍານຳ	1
ແຜນທີ່ປະເທດລາວ	2
ສາລະບານ	3
ຄໍຂອບໃຈ	4
ພິດຜັກປ່າທີ່ນຳໃຊ້ເປັນອາຫານໃນ ສປປ ລາວ	5
ເອກະສານອ້າງໆອີງ	113
ດັດສະນີຊື່ຫ້ອງຖຸນ	115
ດັດສະນີຊື່ວິທະຍາສາດ	119

## ຄໍາຂອບໃຈ (Acknowledgements)

ຄະນະຈັດທຳ ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ມາຍັງລັດຖະບານ, ຄະນະນຳກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ຄະນະນຳສະຖາບັນນິເວດວິທະຍາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຊືວະພາບ ທີ່ເຫັນໄດ້ ຄວາມສຳຄັນໃນການສຶກສາ ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ລວບລວມຊະນິດພັນພິດຜັກປ່າທີ່ພົບໃນ ສປປ ລາວ, ພ້ອມຍັງໄດ້ສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານງົບປະມານໃນການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຈັດພິມຢືນພິດຜັກປ່າ ທີ່ນຳໃຊ້ເປັນອາຫານໃນ ສປປ ລາວ ເຫັນນີ້ ໄວເປັນຂໍ້ມູນ ແລະ ປະໂຫຍດທາງດ້ານການສຶກສາ ແລະ ການອະນຸລັກໄວ້ພູມບັນຍາທ້ອງຖິ່ນ ກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ພິດຜັກປ່າ.

ຂໍຂອບໃຈນຳທ່ານຜູ້ຂ່າງວຊານດ້ານພິດສາດ ທ່ານ ຮສ. ປອ. ວິຈິດ ລໍາໄຊ ຫົວໜ້າພະແນກ ການສຶກສາຫຼັງປາລິນຍາຕີ, ຄະນະວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ທີ່ໄດ້ ໃຫ້ການແນະນຳ ແລະ ກວດແກ້ປິ້ມເຫັນນີ້ ໃຫ້ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນ ແລະ ມີຂໍຜິດພາດໜ້ອຍທີ່ສຸດ.

ຂໍຂອບໃຈມາຍັງຄະນະນຳພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຕ່ລະແຂວງ ພ້ອມ ພະນັກງານ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ບ້ານ ທີ່ໄດ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ເປັນປະໂຫຍດ.

ຂໍຂອບໃຈມາຍັງພະນັກງານພະແນກນິເວດວິທະຍາ ທີ່ປະກອບສ່ວນໃນການລົງເຕັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະ ປະກອບສ່ວນໃນການຖ່າຍຮູບພາບຊະນິດພັນພິດຜັກປ່າຈຳນວນໜີ່ງ ໃນຢືນເຫັນນີ້.

ຊື່ຫ້ອງຖິ່ນ: ກະຈຸວຂາວ

ຊື່ວິທະຍາສາດ: *Curcuma* sp.

ຕະກຸນ: ZINGIBERRACEAE

ລັກສະນະພືດສາດ:

ຜັກກະຈຸວຂາວເປັນພິດລົມລຸກ ມີເຫັງຈີ້ໃຕ້ດິນ ທຸກພາກສ່ວນມີກິ່ນຫອມ. ໃບດັງວ, ຈັບແບບ  
ວຽນສະຫຼັບ, ມີກ້ານໃບຍາວເປັນກາບຫຼຸມລຳຕົ້ນ, ແຜນໃບຮູບຂອບຂະໜານ ຫຼື ຮູບຮີ, ຍາວ  
30–40 ຊມ, ກວ້າງ 10–20 ຊມ, ກົກໃບມືນ, ຂອບໃບລົງບມືຂົນ, ປາຍໃບຮູວແບ້ມ. ຊຶ່  
ດອກແບບຮວງຕັ້ງ, ຍາວ 15–20 ຊມ, ກ້ານຊໍ່ດອກຍາວ 5–8 ຊມ, ອອກຈາກເຫັງຈີ້, ມີໃບ  
ປະຕັບຊໍ່ດອກຢູ່ກົກຊໍ່ດອກສີຂູວອ່ອນ ດ້ວນປາຍຊໍ່ສີຂາວ, ດອກສີຂາວ.

ການນຳໃຊ້:

ດອກນຳເຄີມາລວກເຮັດຊູບ ແລະ ລວກກັບປິນ, ຮັບແຈ່ວມີລົດຊາດຫວານ.

ການກະຈາຍພັນ: ກະຈຸວຂາວເກີດຕາມພື້ນທີ່ປ່າໄຕກ.



ຊື່ຫ້ອງຖິ່ນ: ກະຈູວແດງ

ຊື່ວິທະຍາສາດ: *Curcuma angustifolia* Roxb

ຕະກຸນ: ZINGIBERRACEAE


ລັກສະນະພືດສາດ:

ຜັກກະຈູວແດງເປັນພືດລົມລຸກ ມີເຫຼົງໄຕ້ດິນ ທຸກພາກສ່ວນມີກິ່ນຫອມ. ໃບດັ່ງວຽ, ຈັບແບບ  
ວຽນສະຫຼັບ, ມີກ້ານໃບຍາວເປັນກາບຫຼຸມລຳຕົ້ນ, ແຜນໃບຮູບຂອບຂະໜານ, ຍາວ 30–60  
ຊມ, ກວ້າງ 10–20 ຊມ, ກົກໃບມິນ, ຂອບໃບລູງບ ມີຂົນ, ບາຍໃບຮູງວແຫຼມ. ຊົ່ວໂມງແບບ  
ຮອງຕັ້ງ, ຍາວ 15–20 ຊມ, ກ້ານຊື່ດອກຍາວ 5–8 ຊມ, ອອກຈາກເຫຼົງ. ໃບປະດັບຊື່  
ດອກສີບົວ ຫຼື ມ່ວງ, ດອກສີເຫຼືອງ.

ການນຳໃຊ້:

ດອກນຳເອົາມາລວກເຮັດຊູບປະສົມກັບຜັກຊະນິດອື່ນໆ ຫຼື ລວກກັບປິນ, ກັບແຈ່ວ ແລະ  
ອາຫານປະເພດອື່ນໆ.

ການກະຈາຍພັນ: ກະຈູວແດງເກີດຕາມພື້ນທີ່ປ່າໄຄກ.



**ຊື່ຫ້ອງຖິ່ນ:** ຜັກກະສາບ

**ຊື່ວິທະຍາສາດ:** *Adenia viridiflora* Craib.

**ຕະກຸນ:** PASSIFLORACEAE

**ລັກສະນະພື້ນສາດ:**

ຜັກກະສາບເປັນພື້ນເຄືອ ມີມີເຕາະ, ລຳຕົ້ນກົມສີຂຽວເຂັ້ມ ຫຼື ສີນໍາຕານອ່ອນ, ເປັນຮ່ອງ  
ຕາມລວງຍາວ. ໃບດັງວ ຈັບແບບລົງສະຫຼັບ, ກ້ານໃບສັ້ນ, ໃບຮູບຫົວໃຈ ຫຼື ຮູບໄຂ່ ຍາວ  
5-15 ຊມ, ກວ້າງ 5-8 ຊມ, ກົກໃບວ້າ ມີຕ່ອມ, ຂອບໃບລົງບ, ປາຍໃບແຫຼມ. ຊົ່ວໂມງແບບ  
ກະຈຸກອອກຕາມຊອກໄປ, ກ້ານຊື່ອກຍາວ, ດອກສີເຫຼືອງ, ກາບດອກສີຂຽວ, ດອກສີ  
ສີເຫຼືອງອ່ອນ. ໝາກກົມສີຂຽວກັງເປັນຮ່ອງຕາມລວງຍາວ.

**ການນຳໃຊ້:**

ຍອດອ່ອນ, ດອກ ແລະ ໝາກອ່ອນ ມີລົດຊາດຂົມ ນຳມາລວກກົນກັບບຶ່ນ, ກັບເຈົວ ແລະ  
ອາຫານປະເພດອື່ນໆ.

**ການກະຈາຍພັນ:** ຜັກກະສາບເກີດຕາມປ່າເລື່ອ ແລະ ປ່າໂຄກ.



**ຊື່ຫ້ອງຖິ່ນ:** ຜັກກະຍ່າ

**ຊື່ວິທະຍາສາດ:** *Caesalpinia mimosoides* Lam.

**ຕະກຸນ:** FABACEAE

**ລັກສະນະພືດສາດ:**

ຜັກກະຍ່າເປັນພືດເຄືອ, ກົງກັນມີຕ່ອມສິນບຳຕານ ແລະ ຫາມ. ໃບປະສົມແບບຂຶນນິກ ຍາວ 25-40 ຊມ, ໃບຍ່ອຍມີ 10-30 ອູ້, ໃບຍ່ອຍຈັບແບບຮຽງສະຫຼັບ, ແຜນໃບຍ່ອຍຮູບຂອບຂະຫານ ຍາວ 10 ມມ, ກວ້າງ 4 ມມ, ກົກໄບມືນ, ຂອບໄບລູງປ, ປາຍໄບມືນມີຕົງຫາມ. ຊຶ່ງ ດອກແບບກະຈ່າງ ອອກຕາມຊອກໄປ ຫຼື ປາຍຍອດ. ດອກສີເຫຼືອງ. ໝາກເປັນຜັກ.

**ການນຳໃຊ້:**

ຍອດອ່ອນມີລິດຊາດສົ່ມ ນຳມາກິນກັບບິ່ນ, ເອະ, ລາບ, ບາງເຂດໃນພາກໃຕ້ນຳເອົາຍອດ ອ່ອນຊອຍໃສ່ລາບຫົດ. ດອກປະຊາຊົນຊາວຫຼວງພະບາງນຳມາກິນກັບຊຸບໜໍ່ໄມ້. ສ່ວນຮາກ ໄຊດອງເຫຼື້າ ເປັນຢາບໍາລຸງກຳລັງ.

**ການກະຈາຍພັນ:** ຜັກກະຍ່າເກີດຕາມປ່າໄຕກ ແລະ ປ່າເລື່າ.



**ຊື່ຫ້ອງຕຶ້ນ:** ຜັກກະດອມ (ໝາກຂີ້ໄກ)

**ຊື່ວິທະຍາສາດ:** *Gymnopetalum cochininchinense* (Lour.) Kurz.

**ຕະກຸນ:** CUCURBITACEAE

**ລັກສະນະພືດສາດ:**

ຜັກກະດອມເປັນພືດເຄືອ ມີມີເກາະ, ລຳຕຶ້ນເປັນຮ່ອງ. ໃບດັ່ງວ່າ ຈັບແບບລົງງະຫຼັບ, ໃບມີ ຫຼາຍຮູບແບບ ເຊັ່ນ ຮູບໜົວໃຈ, ຮູບສາມລົ່ງມ, ຮູບສີລົ່ງມ, ຫ້າລົ່ງມ ແລະ ເປັນແຊກ, ກົກ ໃບວັ້ນ, ແຜນໃບສີຂຽວເຂັ້ມແນມີສີຂຽວອ່ອນ ຜົວໃບຊາ. ດອກດັ່ງວ່າແຍກເພດຢູ່ຕຶ້ນດູວກນ, ສີຂາວ, ອອກຢູ່ຊອກໃບ, ກາບດອກສີຂຽວ, ກົບດອກສີຂາວ. ໝາກຮູບທີ່ ຫຼື ຮູບໄຂ່ເປັນລົ່ງມ ສີຂຽວ ເລາສຸກສີເຫຼື້ອງ ແລະ ສີແດງ.

**ການນຳໃຊ້:**

ປອດ, ໃບອ່ອນ ແລະ ໝາກ ນຳມາລວກກັບເຈົ້ວ, ກັບປິ່ນ, ກັບລາບ ແລະ ນຳໄປແກ້ງໃສ໌ ຊັ້ນ ແລະ ໄສ່ເຫັດປວກ ມີລິດຊາດຂົມໜວນ. ອາກນຳມາບິດຜະສົມນຳຮັອນ ທາບ່ອນທີ່ມີ ອາການເຈັບປວດ. ແກ່່ານັ້ນນຳດື່ມເປັນຢາບັນເທິ່ງອາການໄຂ້ ແລະ ຊ່ວຍໃນການຍ່ອຍ ອາຫານ.

**ການກະຈາຍພົນ:** ຜັກກະດອມເກີດຕາມໄຮ່, ບໍ່ມີເງົ່າ ແລະ ຕາມຮົ້ວສ່ວນຕ່າງໆ.



**ຊື່ທີ່ກໍານົດ:** ຜັກກະດູກຂູງດ, ຜັກກ້ານຕົນ, ລາໄມເລີຍ

**ຊື່ວິທະຍາສາດ:** *Alternanthera sessilis* (L.) A.DC.

**ຕະກຸນ:** AMARANTHACEAE

**ລັກສະນະພືດສາດ:**

ຜັກກ້ານຕົນເປັນພືດລົມລຸກ ສູງ 30-70 ຊມ, ລຳຕົ້ນກົມສິນບໍ່ຕານມີຂົນ, ບໍລິເວນຂຶ້ນໄຟງ. ໃບ  
ດົງວ ຈັບແບບກົງກັນຂ້າມ ຫຼື ກັງວອງນ, ແຜນໃບຮູບຮີ ຫຼື ຮູບຫອກ, ຍາວ 1-3 ຊມ,  
ກວາງ 1-2 ຊມ, ກົກໃບແຫຼມ, ຂອບໃບກັງງ, ປາຍໃບແຫຼມ, ໃບສີຂູງວ. ຊື່ດອກແບບກະ  
ຈຸກແໜ້ນ ອອກຢູ່ຕາມຊອກໃປ, ດອກສີຂາວ.

**ການນຳໃຊ້:**

ນຳເອົາຍອດອ່ອນມາລວກກົນ, ກັບແຈ່ວ, ກັບບິນ ຫຼື ຊຸບປະສົມກັບຜັກຊະນິດອື່ນງ.

**ການກະຈາຍພັນ:** ຜັກກ້ານຕົນພົບເກືອບທຸກໆເຂດ ໃນທົ່ວປະເທດລາວ. ເກີດຕາມບ່ອນຊຸ່ມເຊັນ:  
ຫົ່ງນາ, ແຄມຫ້ວຍ, ແຄມໝອງ ແລະ ຕາມສ່ວນຄົວ.



**ຊື່ທົ່ງຖິ່ນ:** ກະຖິ່ນ

**ຊື່ວິທະຍາສາດ:** *Leucaena leucocephala* (Lam.) de Wit.

**ຕະກຸມ:** FABACEAE

**ລັກສະນະພືດສາດ:**

ກະຖິ່ນເປັນໄມ້ຢືນຕົ້ນ ສູງ 3-7 ມ, ເປືອກລໍາຕົ້ນສີເກີດ ແລະ ເປັນຕຸ່ມນູນ. ໃບປະກອບແບບ  
ຂົນນິກ, ຈັບແບບລົງງສະຫຼັບ, ແຜນໃບຍ່ອຍມີ 6-20 ຄູ່ ຈັບແບບກົງກັນຂ້າມ ແຜນໃບຮູບ  
ຂອບຂະໜານ, ຍາວ 6-12 ມມ, ກວ້າງ 2-5 ມມ, ກົກໃບບັງວ, ຂອບໃບລຽບມີຂົນ, ປາຍໃບ  
ແຫຼມ. ຊໍດອກແບບກະຈຸກ, ອອກຕາມກົງງ່າ ແລະ ປາຍກົງ, ດອກສີຂາວ. ໝາກເປັນຜັກແປ  
ສີຂູ່ວ ເວລາແກ່ເປັນສິນ້າຕານ.

**ການນຳໃຊ້:**

ຍອດອ່ອນ ແລະ ໝາກອ່ອນ ມີລົດຊາດຝາດ ກົນເປັນຜັກສິດກັບແຈ່ວ, ກັບລາບ, ກັບເປັນ  
ແລະ ຕຳໝາກຫຼຸງ. ແກ່ນອ່ອນຂາບເປັນສິນລ້າໃນຕະຫຼາດ ແຂວງຄຳມ່ວນ ປະຊາຊົນ  
ນີ້ມີມຳນົມາໂຮຍໃສ່ຕຳໝາກຫຼຸງ.

**ການກະຈາຍພັນ:** ກະຖິ່ນເກີດຕາມປ່າເລົ່າ ແລະ ຕາມສວນ.



ຊື່ທັງຖິ່ນ: ກະໂດນນຳ

ຊື່ວິທະຍາສາດ: *Barringtonia acutangula* (L.) Gaertn .

ຕະກຸມ: LECYTHIDACEAE

ລັກສະນະພືດສາດ:

ກະໂດນນຳເປັນໄມ້ຢືນຕົນສູງ 6-8 ມ, ລຳຕົ້ນກົມ. ໃບດົງວຈັບແບບລົງສະຫຼັບ, ແຜນໃບຮູບໄຂໍຢືນ ຫຼື ຮູບທອກຢືນ ຍາວ 6-16 ຊມ, ກວ້າງ 3-8 ຊມ, ກົກໄປຮຽວ, ຂອບໃບລົງບ, ປາຍໃບແຫຼມ, ຜົວໃບເຫຼືອມມັນສີຂຽວ, ໃບອ່ອນສີແດງ ຫຼື ນຳຕາມເຂັ້ມ. ຊໍດອກເປັນຮວງຮ້ອຍລົງ ອອກຢູ່ປາຍກົງງ່າ, ດອກສີແດງອິມບົວ, ກາບດອກມີ 4 ກາບ ສີຂຽວ, ກົບດອກມີ 4 ກົບສີແດງອິມບົວ ຫຼືນງ່າຍ.

ການນຳໃຊ້:

ຍອດອ່ອນມີລິດຝາດ ກົມກັບແຈ່ວ, ກັບລາບ, ກັບປິນ ແລະ ພັນປາ.

ການກະຈາຍພັນ: ກະໂດນນຳເກີດຕາມແຄມນຳ ແລະ ປ່າໂຄກ.



ຊື່ຫ້ອງຖິ່ນ: ກະໂດນໂຄກ

ຊື່ວິທະຍາສາດ: *Careya sphaerica* Roxb.

ຕະກຸນ: LECYTHIDACEAE

ລັກສະນະພືດສາດ:

ໄມ້ຢືນຕົ້ນສູງ 10–15 ມ, ລຳຕົ້ນເປື້ອກນອກສີນໍ້າຕານ. ໃບຄ່ງວ ຈົບແບບຮຽງສະຫຼັບ, ໃບຮູບໄຂໜີນ, ຍາວ 2–5 ຊມ, ກວ້າງ 1–3 ຊມ, ກົກໃບບັງວ, ຂອບໃບແສກແຂວ, ປາຍໃບມິນ ມີຕຶງແຫຼມ, ໃບສີຂຽວເຫຼື້ອມມັນ. ຊື່ດອກເປັນຮວງອອກຢູ່ປາຍ. ກາບດອກ ສີຂຽວ. ກົບດອກ ສີບົວອ່ອນ ຫຼິ້ນງ່າຍ. ເກສອນຜູ້ມີຈຳນວນ. ໝາກກົມອວບນໍ້າ.

ການນຳໃຊ້:

ຍອດອ່ອນ ແລະ ໝາກອ່ອນ ມີລົດຊາດຝາດ ກົນເປັນຜັກສິດ ກັບປິນ, ກັບລາບ ແລະ ໃບຍັງໃຊ້ເປັນຜັກພັນປາ.

ການກະຈາຍພັນ: ກະໂດນໂຄກເກີດຕາມພື້ນທີ່ປ່າໄໂຄກ ແລະ ປ່າເລື່າ.



**ຊື່ຫ້ອງຕຶ່ນ:** ຜັກກາດນິກາຢູ່ງ (ຜັກກາດຮອງ)

**ຊື່ວິທະຍາສາດ:** *Rorippa indica* (L.) Hiern

**ຕະກຸນ:** BRASSICACEAE

**ລັກສະນະພືດສາດ:**

ຜັກກາດນິກາຢູ່ງເປັນພິດລົມລຸກສູງ 20-40 ຊມ ລຳຕົ້ນ ແລະ ກົງງ່າເປັນລ່ຽມ ສີຂັງວົມ ສີມ່ວງແດງ. ໃບດັ່ງວິທະຍາສາດ ຈັບແບບລົງສະຫຼັບ, ກ້ານໃບສັ້ນ, ແຜນໃບຮູບຮີ ຫຼື ຮູບຫອກ, ຍາວ 3-12 ຊມ, ກວ້າງ 2-4 ຊມ, ກົກໄປຮຽງແຫຼມ, ຂອບໃບເປັນຕົ້ນ ຫຼື ແບບແຊກແຂວເລື່ອຍ, ປາຍໃບແຫຼມ, ຊື່ດອກແບບກະຈຸກ ຫຼື ແບບຮອງຕັ້ງ ອອກຢູ່ປາຍຍອດ ຫຼື ຕາມຊອກໃບ, ດອກສີແຫຼືອງ, ກາບດອກມີ 4 ກາບ ສີຂັງວິ, ກົບດອກ ມີ 4 ກົບ ສີເຫຼືອງ.

**ການນຳໃຊ້:**

ຕົ້ນອ່ອນນຳມາຄັ້ນເຮັດຜັກສົມຜັກ ແລະ ຕົ້ນສົດໃຊ້ແກ້ໄສ່ຂຶ້ນ ຫຼື ໄສ່ປາ.

**ການກະຈາຍພັນ:** ຜັກກາດນິກາຢູ່ງ ເກີດຢູ່ຕາມແຄມນຳ ແຄມຫ້ອຍ ແລະ ຕາມຫົ່ງນາ.



**ຊື່ຫ້ອງຖິ່ນ:** ຜັກກາບປີ

**ຊື່ວິທະຍາສາດ:** *Commelina diffusa* Burm. f.

**ຕະກຸນ:** COMMELINACEAE

**ລັກສະນະພືດສາດ:**

ຜັກກາບປີເປັນພືດລົມລຸກ ສູງ 20-60 ຊມ, ລຳຕົ້ນກົມ. ກ້ານໃບເປັນກາບໃບໂຮບຫຼຸມ ຕາມລຳ ແລະ ບໍລິເວນຂຶ້ແກ່ຂອງລຳຕົ້ນ ມີຮາກປົງອອກ. ໃບດັ່ງວ ແຜນໃບຮູບຫອກ, ຍາວ 3-4 ຊມ, ກວ້າງ 1-2 ຊມ, ກົກໄບມືນ, ຂອບໃບລົງບ, ປາຍໃບແຫຼມ, ໃບສີຂຽວມີຂົນ. ດອກອອກຍອດ ຫຼື ຊອກໃບ ດອກສີຟ້າອ່ອນ, ກາບດອກມີ 3 ກາບ, ກົບດອກມີ 3 ກົບ. ເວລາເດັດຍອດຈະເຫັນຢາງໃສ ຫຼື ເມືອກອອກມາ.

**ການນຳໃຊ້:**

ນຳເອົາຍອດອ່ອນມາລວກກົນ, ຮັບແຈ່ວ, ຮັບເປັນ ຫຼື ນຳມາຊຸບປະສົມກັບຜັກຊະນິດອື່ນໆ.

**ການກະຈາຍພັນ:** ຜັກກາບປີ ເກີດຕາມແຄມຫ້ວຍ, ບົງ ແລະ ບ່ອນທີ່ມີຄວາມຊຸ່ມຊື້ນ.



ຊື່ທົງຖິ່ນ: ຜັກງຸມ

ຊື່ວິທະຍາສາດ: *Crateva magna* (Lour.) DC.

ຕະກຸນ: CAPPARIDACEAE

ລັກສະນະພືດສາດ:

ຜັກງຸມເປັນໄມ້ລົບຕົນ ສູງ 7-15 ມ, ລຳຕົນລົງບເປົອກສີເຫົາ. ໃບປະກອບແບບນິ້ວມີ, ໃບຍ່ອຍມີ 3 ໃບ, ຮູບຮີ ຫຼື ຮູບຫອກ, ປາຍໃບແຫຼມ, ຂອບໃບລົງບ, ກົກໃບຮຽວແຄບ. ຊໍ່ດອກແບບກະຈ່າງ ອອກຢູ່ຊອກໃບ ຫຼື ຍອດ, ມີຈຳນວນຫຼາຍດອກ. ດອກສີເຫຼື້ອງອ່ອນ. ກາບດອກມີ 4 ກາບ ຮູບໄຂ່ ຫຼື ຮູບຂອບຂະໜານ ສີຂຽວອ່ອນ. ກົບດອກມີ 4 ກົບຮູບບ່ວງສີຂາວ. ໝາກຮູບຮີ ສີເຫົາ.

ການນຳໃຊ້:

ຍອດອ່ອນມີລິດຊາດສົ່ມເຜືອນ ນຳມາເຮັດອ່ອມໃສ່ຊົນ ແລະ ໜັກເຮັດສົ່ມຜັກງຸມ ທີ່ມີຂາຍໃນທົງຕະຫຼາດ. .

ການກະຈາຍພັນ: ຜັກງຸມ ມັກເກີດຕາມແຄມນຳ.



ຊື່ຫ້ອງຖິ່ນ: ຜັກງູດ

ຊື່ວິທະຍາສາດ: *Pteridium aquilinum var. esculentum* (G.Forst.) Kuhn.

ຕະກຸມ: DENNSTAEDTIACEAE

ລັກສະນະພືດສາດ:

ພືດລົ້ມລູກມີເຫຼົ້າເລືອຕາມໜັກໃດນ. ໃບປະກອບແບບຂົນນິກາ, ກັກນໃບຍາວ ມີສິນ້າຕານ ແດງ, ໃບຢ່ອຍຂັ້ນໜຶ່ງ ແລະ ຂັ້ນສອງ ກົງກັນຂ້າມກັນ ສີຂຽວ, ຫ້ອງຜົວໃບມີກຸ່ມສະປຳ.

ການນຳໃຊ້:

ຍອດອ່ອນນຳເອົາມາລວກເຮັດຊຸບ, ຂົ້ວ, ເອະໄສ່ປາ ຫຼື ຂັ້ນ ແລະ ສາມາດນຳໄປບຸງ ແຕ່ງອາຫານແບບປະຍຸກໄດ້ ເຊັ່ນ: ນຳໄປຊຸບແປ້ງຫອດ ແລະ ຍັດໃສ້ເຂົ້ານິມ. ເປັນຜັກທີ່ ປະຊາຊົນນິຍົມກິນ ແລະ ຂາຍຫລາຍໃນຫ້ອງຕະຫລາດ.

ການກະຈາຍພັນ: ຜັກງູດ ມັກເວີດຕາມແຄມນຳຊຳ, ແຄມນຳ ແລະ ບ່າທີ່ມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ.



ຊື່ຫັກຖິ່ນ: ຜັກງູດແຮງ

ຊື່ວິທະຍາສາດ: *Gleichenia* sp.

ຕະກຸມ: BLECHNACEAE

ລັກສະນະພືດສາດ:

ຜັກງູດແຮງເປັນພືດລົມລູກ, ມີເຂົ້າເລີ້ອຕາມໜັກເດືອນ. ໃບປະກອບແບບຂົນນິກາ, ກ້ານໃບຢາວສິນນໍ້າຕານແດງ, ໃບຍ່ອຍຈັບແບບກົງກັນຂ້າມ ໃບແກ່ສີຂຽວ, ໃບອ່ອນສີແດງ, ທົ່ອງແຜນໃບມີກຸ່ມສະບູ.

ການນຳໃຊ້:

ຍອດອ່ອນນຳເອົາມາລວກເຮັດຊູບ, ຮັບປຶກ, ຮັບແຈ່ວ ແລະ ນຳມາຂຶ້ວ.

ການກະຈາຍພັນ: ຜັກງູດແຮງ ມັກເກີດຕາມແຄມນຳຊຳ ແລະ ປ່າທີ່ມີຄວາມຊຸ່ມຊື້ນ.



**ຊື່ຫ້ອງຖິ່ນ:** ຜັກກຳນຈອງ

**ຊື່ວິທະຍາສາດ:** *Limnocharis flava* (L.) Buchenau

**ຕະກຸມ:** LIMNOCHARITACEAE

**ລັກສະນະພິດສາດ:**

ຜັກກຳນຈອງເປັນພື້ນເນົາ ລຳເກີນເປັນເຫຼົ້າຢູ່ໃຕ້ເດີນ, ອວບນ້ຳ ສູງ 30-50 ຊມ, ມີຢາງສີຂາວ. ໃບດັ່ງວັນຈັບແບບວຸງນຊອນກັນ, ກັນໃບຍາວເປັນລົງມອວບນ້ຳ. ໃບຮູບໄຂ່ ຍາວ 14-18 ຊມ, ກວາງ 8-12 ຊມ, ຮົກໃບມືນ, ຂອບໃບລົງປ, ປາຍໃບມືນ ຫຼື ຕົ້ງໝາມ, ແຜນໃບສີຂຽວ ຫາມອວບນ້ຳ. ຂໍ້ດອກແບບກະຈຸກ ອອກຢູ່ຕາມຊອກໃບ ຫຼື ປາຍຍອດ 4-10 ດອກ, ດອກ ສີເຫຼືອງອ່ອນ, ກາບດອກ 3 ກາບ ຮູບໄຂ່ສີຂຽວ, ຮົບດອກ 3 ຮົບ ຮູບໄຂ່ສີເຫຼືອງ ຫຼື ເໜືອງອ່ອນ. ເກສອນຜູ້ມີຈຳນວນຫຼາຍ.

**ການນຳໃຊ້:**

ຍອດອ່ອນ, ຂໍ້ດອກ ແລະ ຫາກອ່ອນ ມີລິດຊາດຂຶ້ນຫວານ ນຳເອົາມາລວກລວກຊຸບ, ລວກ ກິນກັບແຈ່ວ, ກັບບິນປາ. ໃບອ່ອນນຳມາເປົ້າຕຳແຈ່ວ. ນອກຈາກນັ້ນ ຂໍ້ດອກອ່ອນ ແລະ ຫາກອ່ອນ ນີ້ຍືນນຳມາລວກກິນກັບເຂົ້າບຸນນ້ຳຮອນ ຫຼື ເຂົ້າບຸນນ້ຳປາແດກ.

**ການກະຈາຍພັນ:** ຜັກກຳນຈອງ ເກີດຕາມທົ່ວມາ ບໍລິເວນນ້ຳຂັ້ງ, ແຄມປົງ ແລະ ແຄມໝາງ.



**ຊື່ທົ່ວເຖິ່ນ:** ກວຍປ່າ

**ຊື່ວິທະຍາສາດ:** *Musa paradisiaca* L.

**ຕະກຸນ:** MUSACEAE

**ລັກສະນະພືດສາດ:**

ກວຍປ່າເປັນພືດລົມລູກລຳຕົ້ນໃຕ້ດິນ, ກ້ານໃບໂອບຫຼຸມກັນເປັນລຳຕົ້ນທຽມ. ກ້ານໃບຍາວ  
ເປັນຮ່ອງ, ໃບດຸ່ງວັຈີບແບບວູນສະຫຼັບ, ໃບຮູບຂອບຂະໜານຍາວ 1-2 ມ., ກວ້າງ 40-50  
ຊມ, ກົກໃບມືນ, ຂອບໃບລົງບ, ບາຍໃບມືນ, ໃບສີຂຽວເຂັ້ມ, ພື້ນທົ່ວຜົວໃບເປັນນວນ  
ສີຂາວ. ຊື່ດອກເປັນຮວງຫ້ອຍລົງ (ປີ) ອອກຢູ່ປາຍຍອດ, ໃບປະດັບຊື່ດອກສີແດງຫຼິນງ່າຍ  
ແຕ່ລະໃບປະດັບມິດອກ 10-20 ດອກ. ດອກສົມບູນເພດ ແລະ ດອກແຍກເພດ ດອກເພດ  
ແມ່ຢູ່ສ່ວນກົກຊື່ດອກ ແລະ ດອກເພດຜູ້ຢູ່ສ່ວນປາຍຊື່ດອກ. ໝາກເປັນຫ່ອນມີລົງມໍ່າກ  
ອ່ອນສີຂຽວ ເວລາສຸກສີເຫຼືອງ.

**ການນຳໃຊ້:**

ດອກທີ່ຮ້ອງວ່າປີ ມີລົດຊາດຝາດ ນຳມາລວກຊູບ, ກັບປິ່ນ ແລະ ປະສົມໃສ່ເອາະຫຼາມ ແລະ  
ອາຫານປະເພດອື່ນໆ. ໝາກປິດໃບຍັງນຳມາຊອຍເຮັດເຫັນເຊົ້າບັນ.

**ການກະຈາຍພັນ:** ກວຍປ່າເກີດຕາມແຄມນັ້ນ ແລະ ພື້ນທີ່ປ່າດົງ.



**ຊື່ຫ້ອງຖິ່ນ:** ຜັກກຳມູນ (ຜັກນົ້າມັນກີບ, ຜັກວິ່ຮີນ)

**ຊື່ວິທະຍາສາດ:** *Monochoria cyanea* F. Muell.

**ຕະກຸນ:** PONTEDERIACEAE

**ລັກສະນະພືດສາດ:**

ຜັກກຳມູນເປັນພືດລົ້ມລຸກ ລຳຕົ້ນສີຂຽວອວບນໍ້າ ເລືອຕາມໝ້າດິນ ຫຼື ໜ້ານໍ້າ. ໃບດັ່ງວ່າ ຈັບແບບລົງຈະຫຼັບໃບອອກຕາມຂຶ້ນ, ກ້ານໃບຢາວ ເປັນກາບຫຸ້ມລຳຕົ້ນ, ໃບຮູບໄຂ່ ຫຼື ຮູບທົວໃຈ, ຍາວ 4-8 ຊມ, ກວ້າງ 2-4 ຊມ, ກົກໃບວັດ, ຂອບໃບລົງບ, ປາຍໃບແຫຼມ, ແຜນໃບໝາ ຄ້າຍໜັງ ສີຂຽວ. ຂໍ້ດອກແບບກະຈຸກ ອອກຕາມຊອກໃບ ຫຼື ປາຍຍອດ, ດອກສືມວັງ, ມີໃບປະເັບຊໍ່ດອກຮູບໄຂ່.

**ການນຳໃຊ້:**

ທຸກພາກສ່ວນມີລົດຊາດຂົມອ່ອນ ນຳມາກິນເປັນຜັກລືດ ຮັບແງ່ງໜົ່ມໄມ້, ຊຸບໜົ່ມໄມ້ ແລະ ລວກເຮັດຊູບ. ໃບອ່ອນນຳມາຄົ້ນນຳດື່ມ ແກ້ອງການໄອ ແລະ ຂັບຍິ່ງວ່າ, ໃບຕຳໂພະໃສ່ຜິຊ່ວຍບັນເທິງອາການເຈັບປວດໄດ້.

**ການກະຈາຍພັນ:** ຜັກກຳມູນ ເກີດຕາມແຄມນໍ້າ. ຕາມທີ່ງນາ ບ່ອນມີຄວາມຊຸ່ມ ແລະ ນົ້າຂ້າງ.



**ຊື່ຫ້ອງຖິ່ນ:** ຕົ້ນໝາກກອກກ

**ຊື່ວິທະຍາສາດ:** *Spondias pinnata* (L.f.) Kurz

**ຕະກຸນ:** ANACARDIACEAE

**ລັກສະນະພືດສາດ:**

ຕົ້ນໝາກກອກເປັນໄມ້ຢືນຕົ້ນ ສູງ 10-17 ມ, ລຳຕົ້ນຊື່ ແລະ ກົມ, ເປືອກລຳຕົ້ນສີເຫຼີກລູບ. ໃປປະກອບແບບຂົນນິກ, ຈັບແບບກົງກັນຂ້າມ, ໃປຍ່ອຍມີ 4-6 ຖຸ້, ຮູບຂອບຂະໜານ, ຍາວ 7-12 ຊມ, ກວ້າງ 3-4 ຊມ, ກົກໃບບັງວ, ຂອບໃບລູບ, ປາຍໃບແຫຼມ, ໃປສີຂຽວເຫຼືອມ ໃປ ອ່ອນສີແດງ. ຂໍດອກແບບແຍກຂະແໜງ ອອກຢູ່ປາຍຍອດ ຫຼື ຊອກໃບ, ດອກແຍກເພດ ອ່ວມຕົ້ນ, ດອກສີເຫຼືອງອ່ອນ, ກາບດອກ ມີ 5 ກາບ ສີຂຽວອ່ອນ, ກົບດອກ ມີ 5 ກົບ ສີຂາວ. ໝາກອ່ອນສີຂຽວ ເວລາສຸກສີເຫຼືອງ ມີຈຸດສີດຳ.

**ການນຳໃຊ້:**

ຍອດອ່ອນມີລິດຊາດສົ່ມມັນ ກົມເປັນຜັກສົດ ກັບລາບ, ກັບບິນ ແລະ ແຈ່ວ. ໝາກດີບ ແລະ ສຸກມີລິດຊາດສົ່ມຫວານ ນຳໄປຕໍາໃສ່ໝາກຫຼຸ່ມມີລິດຊາດດີ. ໝາກສຸກ ນຳໄປຕໍາແຈ່ວໃສ່ຂຽບ ໜູ່ ເປັນອາຫານຂຶ້ນໂຕະຕາມຮ້ານອາຫານ.

**ການກະຈາຍພັນ:** ຕົ້ນໝາກກອກເກີດຕາມປ່າໂຄກ ແລະ ບ່າດົງ.



**ຊື່ຫ້ອງຖິ່ນ:** ເຄືອກອຍ

**ຊື່ວິທະຍາສາດ:** *Dioscorea hispida* Dennst.

**ຕະກຸນ:** DIOSCOREACEAE

**ລັກສະນະພືດສາດ:**

ກອຍເປັນພືດເຄືອ, ມີຫົວໃຕ້ດິນ 3-5 ຫົວຕໍ່ເຄືອ, ເຄືອມີຂົນ ແລະ ຂາມ. ໃບປະສົມແບບຂົນ ນົກ, ຈັບແບບຮຽງສະຫຼັບ, ໃບຍ່ອຍມີ 3 ໃບ, ກົກໄປຮຽວ, ຂອບໄປລູງປ, ປາຍແຫຼມ. ຊໍ ດອກແບບກະຈ່າງ ອອກຢູ່ຊອກໄປ, ດອກສີເຫຼືອງອ່ອນ.

**ການນຳໃຊ້:**

ຫົວກອຍ ອອຍເປັນແຜນບາງງ ລ້າງນຳໝາຍໆລັ້ງ ຫຼື ແຊ່ນຳ ຈາກນັ້ນນຳໄປລ້າງ ແລ້ວໜຶ່ງ ປະສົມນຳຕານ, ພາກກວ່ວຍນຳໜຶ່ງ ແລະ ພາກພ້າວ ກິນເປັນອາຫານຫວ່າງ.

**ການກະຈາຍພັນ:** ເຄືອກອຍ ເກີດຕາມປ່າໂຄກ, ປ່າເທົ່າ ແລະ ປ່າດົງ.



ຊື່ຫ້ອງຖິ່ນ: ຜັກຂະແຍງ (ຜັກສະແງງ)

ຊື່ວິທະຍາສາດ: *Limnophila geoffrayi* Bonati

ຕະກຸນ: SCROPHULARIACEAE

ລັກສະນະພິດສາດ:

ຜັກຂະແຍງເປັນພິດລົ້ມລຸກ ສູງ 10-20 ຊມ, ລຳຕົ້ນກົມອວບນັ້ນ ສີຂຽວອ່ອນ ມີຂືນ, ຖຸກ ພາກສ່ວນມີກິ່ນຫອມ. ໃບດັ່ງຈັບແບບກົງກັນຂ້າມ, ບໍ່ມີກັນໃປ, ໃບຮູບຮີ ຫຼື ຮູບຫອກ ຍາວ 1-3 ຊມ, ກວ້າງ 1-2 ຊມ, ກົກໃບແໜ່ມ, ຂອບແບບແສກເຂົວເລື່ອຍ, ປາຍໃບ ແໜ່ມ, ແຜນໃບສີຂຽວ ມີຂືນ. ດອກດັ່ງວ່າ ຫຼື ເປັນຊື່ແບບກະຈຸກ ອອກຢູ່ຕາມຊອກໃບ ຫຼື ປາຍຍອດ ສິມ່ວງອ່ອນ ຫຼື ສີບົວອ່ອນ.

ການນຳໃຊ້:

ຫຼຸກພາກສ່ວນກົມໄດ້ມີກິ່ນຫອມ ນຳມາແກ່ໄສ່ໜໍ່ໄມ້ ແລະ ນຳມາໃສ່ຕົ້ນສິນປາຊ່ວຍດັບກິ່ນ ຕາວ ມີລິດຊາດດີ. ໜົດຕົ້ນນຳມາຕົ້ນນັ້ນດື່ມ ເປັນຢາແກ້ຫ້ອງອີດ ແລະ ໄລ່ລົມໃນຫ້ອງ.

ການກະຈາຍພື້ນ: ຜັກຂະແຍງເກີດຕາມທົ່ວມາ, ແຄມຫ້ວຍນັ້ນ ຕາມພື້ນທີ່ມີນາຂັ້ງ.



ຊື່ຫ້ອງຖິ່ນ: ຂ່າປ່າ, ຂ່ານ້ອຍ (ເງື່ອງ)

ຊື່ວິທະຍາສາດ: *Alpinia conchigera* Griff

ຕະກຸນ: ZINGIBERRACEAE

ລັກສະນະພືດສາດ:

ຂ່າປ່າເປັນພືດລົມລຸກສູງ 50-150 ຊມ. ໃບດັ່ງວິຈີບແບບລົງສະຫຼັບ, ກັນໃບຍາວເປັນກາບຫຼຸມລຳຕົ້ນ. ໃບຮູບຂອບຂະໜານ, ຍາວ 15-30 ຊມ, ກວ້າງ 4-10 ຊມ, ກົກໃບມືນ, ຂອບໃບລົງປົງ, ປາຍໃບແຫຼມ, ແຜນໃບໝາຄ້າຍໜັງເງື່ອມມັນ. ຊໍດອກແບບເປັນຮວງຕັ້ງ, ດອກສີຂາວອິມສີແດງ. ໝາກຮູບຮີສີຂູງວ.

ການນຳໃຊ້:

ໜໍ່ອ່ອນມີລົດຊາດເຜັດນຳເອົາມາລວກກັບແຈ່ວ ກັບຢືນ ແລະ ນຳມາຊຸບປະສົມກັບຜັກຊະນິດຫົງ ແລະ ແກ້ໄສ໌ໜໍ່ໄມ້.

ການກະຈາຍພັນ: ຂ່າປ່າເກີດຕາມປ່າໂຄກ ແລະ ແຄມນຳ.



ຊື່ຫ້ອງຖິ່ນ: ຂ່າໂຄມ

ຊື່ວິທະຍາສາດ: *Alpinia bracteata* Roxburgh

ຕະກຸນ: ZINGIBERRACEAE

ລັກສະນະພືດສາດ:

ຂ່າໂຄມເປັນພືດລົມລຸກມີເຫຼົ້າໃຕ້ດິນ, ລຳຕົ້ນກົມສູງ 1-2 ມ. ໃບດັ່ງວຶ, ຈັບແບບລົງສະຫຼັບ,  
ກັນໃບເປັນກາບທຸມລຳຕົ້ນ, ແຜນໃບຮູບໄຂ່ ຫຼື ຮູບໂຮ, ຍາວ 20–50 ຊມ, ກວ້າງ 10–20  
ຊມ, ກົກໃບຮຽງແຜ່ນ, ຂອບໃບລົງປ, ປາຍໃບແຜ່ນ, ແຜນໃບໝາຄ້າຍໜ້າສີຂຽວເຫື້ອມມັນ.  
ຊື່ດອກແບບຮວງຕັ້ງ, ກັນຊື່ດອກຍາວ ມີ 10–20 ດອກອອກຢູ່ປາຍຍອດ, ດອກສີຂາວແກມ  
ສີສົ່ມ, ໝາກກົມສີຂຽວ ເວລາສຸກສີແດງ.

ການນຳໃຊ້:

ຍອດອ່ອນ ແລະ ດອກ ນຳມາລວກ ຫຼື ຫົ້ງ ເຮັດຊູບ ແລະ ກັບອາຫານປະເພດອື່ນໄດ້.

ການກະຈາຍພັນ: ຂ່າໂຄມເກີດຕາມປ່າດົງ, ປ່າເຫຼົ້າ.



ຊື່ຫ້ອງຖິ່ນ: ຂີງປ່າ (ປະເທດ)

ຊື່ວິທະຍາສາດ: *Zingiber* sp.

ຕະກຸນ: ZINGIBERRACEAE

ລັກສະນະພືດສາດ:

ຂີງປ່າເປັນພົດລົມລຸກມີເຫຼົ້າໃຕ້ດິນ. ໃບດຸ່ວ, ກ້າມໃບເປັນກາບຫຼຸ່ມລຳຕົ້ນ, ແຜນໃບຮູບຂອບຂະໜານ ຫຼື ຮູບທອກ, ຍາວ 21–28 ຊມ, ກວ້າງ 6–12 ຊມ, ກົກໄບວ້າ, ຂອບໃບລົງປ, ປາຍໃບແຫຼມ, ແຜນໃບສີຂຽວເຫຼືອມມັນ. ຊໍດອກແບບເປັນຮວາງຕັ້ງແຈບ, ອອກຈາກເຫຼົ້າ, ໃບປະດັບຊື່ດອກສີແດງ, ດອກສີຂາວ ຫຼື ເຫຼືອງອ່ອນ.

ການນຳໃຊ້:

ດອກມີລົດຊາດຫວານກິນເປັນຜັກສິດກັບອາຫານ.

ການກະຈາຍພັນ: ຂີງປ່າເກີດຕາມປ່າເລົ່າ ແລະ ແຄມນຳ.



**ຊື່ຫ້ອງຖິ່ນ:** ຂາມປ້ອມ

**ຊື່ວິທະຍາສາດ:** *Phyllanthus emblica* L.

**ຕະກຸນ:** PHYLLANTHACEAE

**ລັກສະນະພືດສາດ:**

ຂາມປ້ອມເປັນໄມ້ຢືນຕົ້ນ, ສູງ 8–12 ມ, ເບືອກລອກເປັນແຜນຕາມລວງຍາວ. ໃບຄຸງວ, ຕ້າຍຕີໃບປະສົມ, ຈັບແບບສະລັບ, ໃບຮູບຂອບຂະໜານ, ຍາວ 1–2 ຊມ, ກວ້າງ 2–3 ມມ, ກົກໃບບັງວ, ຂອບໃບລູງບ, ປາຍໃບມິນ. ຫຼູໃບຮູບສາມຫຼູງມ. ຂໍດອກແບບກະຈຸກອອກຢູ່ຊອກ ໃບ. ດອກແຍກເພດຢູ່ຕົ້ນຄູງວກັນ, ດອກສີເຫຼືອງອ່ອນ. ໝາກກົມ, ສີຂຽວອ່ອນ, ແກ່ານສິນ້າ ຕານ.

**ການນຳໃຊ້:**

ໝາກຂາມປ້ອມກົມເປັນໝາກລົ້ມ ມີລິດຊາດຫວານຂົມ. ໝາກຍັງໃຊ້ເປັນຍາດີໄອ ດ້ວຍວິທີ ນຳເອົາໝາກມາຫຍ້າກົມ, ສ່ວນລຳຕົ້ນນຳໄປຕົ້ນກົມເປັນຢາລິດຕ້າງຊົງ.

**ການກະຈາຍພັນ:** ຂາມປ້ອມເວົົດຕາມປ່າໂຄກ ແລະ ປ່າດົງ.



ຊື່ທັງຖິ່ນ: ຂົມກະເດີາ

ຊື່ວິທະຍາສາດ: *Azadirachta indica* A. Juss.

ຕະກຸນ: MELIACEAE


ລັກສະນະພືດສາດ:

ຂົມກະເດີາເປັນຢືນຕົ້ນໄມ້ ສູງ 10-17 ມ, ເປົອກລຳຕົ້ນສິນນໍາຕາມແດງ ຫຼື ສີເຫີກປິນດຳ, ເປົອກແຕກເປັນເກົດ. ໃບປະກອບແບບຂົນນິກ ບາຍໃບຄິກ ໃບຈັບແບບຮຽງສະຫຼັບ, ກ້ານ ໃບມືຕ່ອມ, ໃບຍ່ອຍມີ 8-10 ຊຸ່, ແຜນໃບຮູບທອກ ຫຼື ກ່ຽວໂຄງ, ຍາວ 5-9 ຊມ, ກວ້າງ 1-3 ຊມ, ກົກໃບບັງວ, ຂອບໃບແບບແຂວເລື່ອຍ, ບາຍໃບແຫຼມ, ໃບຂຽວເຫຼືອມ ໃບອ່ອນ ສີແດງ. ຊຳດອກແບບແຍກຂະແໜ່ງອອກຢູ່ຂອກໄປ ຫຼື ປາຍກົງ, ມີໃບປະດັບຮູບທອກ. ດອກ ສີຂາວ ມີກິ່ນຫອມ, ກົບດອກ 5 ກີບ. ໝາກກົມໃສ້ຂຽວ ເວລາສຸກສີເຫຼືອງ.

ການນຳໃຊ້:

ຍອດອ່ອນ ແລະ ດອກມີລົດຊາດຂົມ ລວກກັບຜັກກັບລາບ ກັບປິ່ນ ຫຼື ແຈ່ວປາແດກ. ເປັນ ຜັກນຳມາຂາຍເປັນສິນຄ້າໃນທັງຕະຫຼາດ.

ການກະຈາຍພັນ: ຂົມກະເດີາເກີດຕາມປ່າເລົ່າ ແລະ ປ່າໂຄກ.



**ຊື່ຫ້ອງຖິ່ນ:** ໝາກເຂືອເຖື່ອນ (ໝາກໄກ)

**ຊື່ວິທະຍາສາດ:** *Diospyros chevalieri* Lecomte

**ຕະກຸນ:** EBENACEAE

**ລັກສະນະພືດສາດ:**

ໝາກເຂືອເຖື່ອນ ເປັນຢືນຕົ້ນ ສູງ 5-7 ມ, ລຳຕົ້ນກົມ, ກົງງ່າອ່ອນມີຂົນ. ໃບດູງວັຈັບແບບ  
ລົງລະຫຼັບ, ແຜນໃບຮູບຂອບຂະໜານ, ຍາວ 20-27 ຊມ, ກວ້າງ 3-5 ຊມ, ກົກໃບມືນ,  
ຂອບໃບລົງບ, ປາຍໃບແຫຼມ, ແຜນໃບສີຂຽວເຫຼື້ອມ. ຊື່ດອກແບບກະຈຸກ ຫຼື ດອກດູ່ວອອກ  
ຢູ່ຊອກໄປ ຫຼື ປາຍກົງ.

**ການນຳໃຊ້:**

ຍອດອ່ອນມີລິດຊາດຝາດກົມກັບລາບ ແລະ ກັບບິນ.

**ການກະຈາຍພັນ:** ໝາກເຂືອເຖື່ອນ ເກີດຕາມປ່າເລົ່າ ແລະ ປ່າໂຄກ.



**ຊື່ຫ້ອງຖິ່ນ:** ຕັ້ງ

**ຊື່ວິທະຍາສາດ:** *Donax cannaeformis* (G.Forst.) K.Schum.

**ຕະກຸມ:** MARANTACEAE

**ລັກສະນະພື້ນສາດ:**

ຜັກຕັ້ງເປັນພົດລົມລຸກ ລຳຕົ້ນເປັນກຳສູງ 1-3 ມ, ມີ ໜັງວິຈີ ຫຼື ຫົວໃຕ້ດິນ. ໃບດູງວິຈີແບບ  
ຮຽງສະຫຼັບ, ກ້ານໃບຢາວເປັນກາບຫຸ້ມລຳຕົ້ນ, ແຜນໃບຮູບໄຂ່ ຫຼື ຮູບຮີ, ຍາວ 10-30 ຊມ,  
ກວາງ 6-17 ຊມ, ກົກໃບຮູບລື່ມ, ຂອບໃບລົງບ, ປາຍໃບແຫຼມ, ແຜນໃບສີຂູງວ່ານາຄັ້ງ  
ໜັງ. ຊໍດອກແບບເປັນຮວງ, ອອກຢູ່ປາຍຍອດ, ດອກສີຂາວ.

**ການນຳໃຊ້:**

ຍອດອ່ອນມີລິດຊາດສົ່ມ ນຳມາກິນເປັນຜັກສິດ ກິນກັບບິນ ຫຼື ນຳໄປລວກເຮັດຊູບປະສົມກັບ  
ຜັກອື່ນງ.

**ການກະຈາຍພັນ:** ເກີດຕາມແຄມນຳ ແລະ ຕາມຕົ້ນຜ່າ ບໍ່ອນມີຄວາມຊຸມ.



ຊື່ຫ້ອງຖິ່ນ: ຄົ້ມສົມ

ຊື່ວິທະຍາສາດ: *Schleichera oleosa* (Lour.) Oken.

## ຕະກູນ: SAPINDACEAE

## ລັກສະນະພິດສາສາດ:

ຕົ້ນຄໍ້ສົມເປັນໄມ້ຢືນຕົ້ນ ສູງ 10-15 ມ, ລຳຕົ້ນຄົດໆ ແລະ ເປັນຫຼຸດ, ເປົອກນອກສີເຫຼົາ. ໃບປະກອບແບບຂົນນິກປາຍໃບຄູ່, ມີໃບຢ່ອຍ 2-4 ຄູ່, ແຜນໃບຮູບໄຂ໌ ຫຼື ຮູບຮົກ, ຍາວ 8-25 ຊມ, ກວ້າງ 4-12 ຊມ, ໃບຄູ່ເທິງໃຫຍ່ກວ້າງກວ່າໃບຄູ່ລຸ່ມ ກົກໃບແຫຼມ, ຂອບໃບລົງບ, ປາຍໃບມືນ ຫຼື ຕຶ່ງໝາມສັນໆ, ໃບສີຂຽວໝາ ໃບອ່ອນສີແດງ. ຊໍດອກແບບເປັນຮວງ ຫຼື ແບບທາງກະຮອກ ອອກຢູ່ປາຍກົ່ງ ຫຼື ຊອກໃບ, ດອກນ້ອຍສີເຫຼືອງອ່ອນ, ມີກົບດອກ 5 ກີບ. ໝາກກົມ ຫຼື ຮູບໄຂ໌ ສີຂຽວ ໝາກສຸກສິນ້ຕາມ.

ການນຳໃຊ້:

ធមាត្រស្ថាបនិតាគារណ៍ កិច្ចបំផុតធមាត្រស្ថាបនិតាគារណ៍របស់ខ្លួន។

ການກະຈາຍພັນ: ຕົ້ນຄໍສົມເກີດຕາມປ່າໄຕກ.



**ຊື່ຫ້ອງຖິ່ນ:** ໝາກຄໍແລນ (ໝາກແງວ)

**ຊື່ວິທະຍາສາດ:** *Nephelium hypoleucum* Kurz.

**ຕະກຸນ:** SAPINDACEAE

**ລັກສະນະພືດສາດ:**

ຕົ້ນໝາກຄໍແລນເປັນໄມ້ຢືນຕົ້ນ ສູງ 10–20 ມ, ລຳຕົ້ນຄົດຈຳ ເປືອກສີນໍ້າຕາມ. ໃບປະກອບແບບຂົນນິກ, ຈັບແບບລົງສະຫຼັບ, ໃບຍ່ອຍ ມີ 3-10 ໃບ, ແຜນໃບຮູບຂອບຂະໜານ, ຍາວ 10-20 ຊມ, ກວ້າງ 3-8 ຊມ, ກົກໃບມືນ ຫຼື ບັງວ, ຂອບໃບລົງປ, ປາຍໃບແຫຼມ, ຜົວໃບສີຂຽວໝາກົງ. ຊື່ດອກແບບແຍກຂະແໜງ ອອກຢູ່ປາຍກົງ ດອກສີຂາວ. ໝາກຮູບຮີເປືອກເປັນຕຸດ, ໝາກອ່ອນສີຂຽວ ເລາສຸກສີແດງ.

**ການນຳໃຊ້:**

ໝາກສຸກມີລິດຊາດສົ່ມຫວານ. ກິນເປັນໝາກໄມ້ ແລະ ໝາກສົ່ມກັບແຈ່ວ.

**ການກະຈາຍພັນ:** ຕົ້ນໝາກຄໍແລນເກີດຕາມປ່າດົງ, ປ່າເລົ່າ.



ຊື່ທັງຖິ່ນ: ຕົ້ນໄຄ

ຊື່ວິທະຍາສາດ: *Croton* sp.

ຊື່ຕະກູນ: EUPHOBIAEAE

ລັກສະນະພື້ນສາດ:

ຕົ້ນໄຄເປັນໄມ້ພຸ່ມ ສູງ 3-4 ມ, ເປົ້ອກນອກລຳຕົ້ນສີດຳ. ໃບດັ່ງວ່າ ຈັບແບບກັງວຽງ, ກັານ  
ໃບສັ້ນ, ໃບຮູບຂອບຂະໜານ ຍາວ 2-8 ຊມ, ກ້ວາງ 1-2 ຊມ, ກົກໃບແຫຼມ, ຂອບໃບແສກ  
ແຂວເລື່ອຍ, ປາຍໃບວັດ, ຜົວໃບດ້ານເທິງສີຂູງວເຂັ້ມ, ຜົວໃບດ້ານລຸ່ມສີຂູງວອ່ອນ. ຊື່ດອກ  
ແບບເປັນຮວງ ອອກຕາມກົງກັນ. ກາບດອກມີ 5 ກາບ ສີຂູງວອິມສົ່ມມີຂົນ. ກົບດອກມີ 5  
ກົບ ສີຂາວ. ຫຼາກກົມມີ 3 ຮ່ອງ ປາຍໝາກມີຮ່ວງຮັບລະອອງເກສອນຕິດຢູ່ສາມອັນ.

ການນຳໃຊ້:

ຊື່ດອກມີລິດຊາດຂົມອ່ອນ ນຳມາລວກກົນກັບລາບ ກັບກົອຍ ແລະ ຕົ້ນປາແດກ (ບິນປາ),  
ຍອດອ່ອນຍັງກົນເປັນຜັກສິດກັບລາບ ແລະ ອາຫານປະເພດອື່ນງູ.

ການກະຈາຍພັນ: ຕົ້ນໄຄເກີດຕາມແຄມນຳ.



**ຊື່ຫ້ອງຖິ່ນ:** ດອກແຄ

**ຊື່ວິທະຍາສາດ:** *Markhamia stipulata* (Wall.) Seem. ex K.Schum.

**ຊື່ຕະກູນ:** BIGNONIACEAE

**ລັກສະນະພື້ນສາດ:**

ຕົ້ນແຄເປັນໄມ້ຢືນຕົ້ນສູງ 5-10 ມ, ລຳຕົ້ນກົມ. ໃບປະສົມແບບຂົນນິກ ມີໃບຍ່ອຍ 4-8 ສູ່, ຜູບຂອບຂະໜານ ຫຼື ຜູບຮີ, ຍາວ 12-26 ຊມ, ກວ້າງ 6-13 ຊມ, ກົກໃບແຫຼມ ຫຼື ກົມ, ຂອບໃບເປັນຄື່ນ, ບາຍໃບແຫຼມ, ໃບສີຂຽວມີຂົນ. ດອກເປັນຊໍແບບກະຈ່າງ ມີ 4-10 ດອກ, ກາບດອກສີເຫຼືອງອ່ອນມີຂົນ, ກົບດອກດ້ານນອກສີເຫຼືອງອ່ອນ ດ້ານໃນສີແດງ. ເກສອນຜູ້ 2 ອັນສັນ, 2 ອັນຍາວເຊື່ອມຕິດກັບກົບດອກ. ເກສອນແມ່ຍ່າວກ່າວເກສອນຜູ້. ໝາກເປັນຝັກມີ ຂົນ.

**ການນຳໃຊ້:**

ດອກມີລົດຊາດຂົນ ນຳມາລວກ ຫຼື ຫົ້ງກັບເປັນ, ກັບແຈ່ວປາແດກ ແລະ ລາບປາ. ດອກ ຢັ້ງນຳໄປຮັດອ່ວຊັນໜູ້ ແລະ ອ່ວປາຊື່ງເປັນອາຫານພື້ນເມືອງຂອງລາວ.

**ການກະຈາຍພັນ:** ດອກແຄເກີດຕາມປ່າເລົ່າ ແລະ ປ່າດົງ.



**ຊື່ຫ້ອງຖິ່ນ:** ຄອນແຄນ (ປະຍີງ)

**ຊື່ວິທະຍາສາດ:** *Dracaena angustifolia* Roxb.

**ຕະກຸນ:** DRACAENACEAE

**ລັກສະນະພືດສາດ:**

ຄອນແຄນເປັນໄມ້ພຸ່ມສູງ 2-3 ມ, ໄມເນື້ອຂອ່ອນ. ໃບດັ່ງວິຈີບແບບຮຽງສະຫຼັບ ຫຼື ກັງວອງນ, ແຜນໃບຮູບແຖບ ຍາວ 20-50 ຊມ, ກວາງ 2-3 ຊມ, ກົກໃບຮຽງເປັນກາບຫຼຸ່ມລຳຕົ້ນ, ຂອບໃບລົງບ, ປາຍໃບແຫຼມ, ແຜນໃບໝາຄ້າຍໜັງ ຜົວໃບລົງບເຫຼືອມມັນ. ຂໍດວກແບບແຕກຂະແໜງອອກຕາມຊອກໄປ ແລະ ປາຍກິ່ງ, ດອກມີຈຳນວນຫຼາຍສີເຫຼືອງອ່ອນ, ມີໃບປະດັບຮູບໄຂສີຂູງວ. ພາກກົມສີຂູງວ ເວລາສຸກສີເຫຼືອງ ຫຼື ສີສົ່ມ.

**ການນຳໃຊ້:**

ຍອດອ່ອນ ແລະ ດອກ ມີລົດຊາດຫວານນຳມາລວກຊຸບປະສົມກັບຜັກຊະນິດອື່ນ ແລະ ແກງໃສ່ໜໍ່ໄມ້.

**ການກະຈາຍພັນ:** ຄອນແຄນເກີດຕາມພື້ນທີ່ປ່າເລົ່າ ແລະ ປ່າດົງ.



**ຊື່ຫ້ອງຖິ່ນ:** ຜັກຄາດ

**ຊື່ວິທະຍາສາດ:** *Blainvillea acmella* (L.) Philipson.

**ຕະກຸມ:** ASTERACEAE

**ລັກສະນະພື້ນສາດ:**

ຜັກຄາດເປັນພົດລົ້ມລູກ ສູງ 10-20 ຊມ, ລຳຕົ້ນກົມອວບນົ້າ ລຳແກ້ສີແດງອິນສີສົ້ມ ລຳອ່ອນສີມີຂຶນ. ໃບດັ່ງວ່າ ຈັບແບບກົງກັນຂ້າມ, ແຜນໃບຮູບໄຂ່ ຫຼື ຮູບສາມລົງມ, ຍາວ 3-5 ຊມ, ກວ້າງ 2-3 ຊມ, ເສັ້ນໃບອອກຈາກກົກໃບມີ 3 ເສັ້ນ, ກົກໃບມືນ, ຂອບໃບເປັນຕົ້ນ, ປາຍໃບແຫຼມ, ໃບສີຂູງວັຜິວໃບຊາ. ຊຳດອກແບບກະຈຸກແໜ້ນ, ດອກສີເຫຼືອງ, ອອກຢູ່ຊອກໃບ ແລະ ຍອດ. ໝາກຮູບປົກ.

**ການນຳໃຊ້:**

ນຳເອົາຍອດອ່ອນມາລວກກົນກຳບແຈ່ວ, ກັບປິ່ນ ຫຼື ນຳມາຊຸບປະສົມກຳບຜັກຊະນິດອື່ນໆ. ຍອດອ່ອນຍັງນຳໄປປຸງແຕ່ງໃສ່ເອາະໜູາມ ແລະ ອາຫານປະເພດເອາະ ຫຼື ອ່ອມ.

**ການກະຈາຍພັນ:** ຜັກຄາດພົບໃນທົ່ວທຸກເຂດ, ບ່ອນດິນຊຸ່ມຊື່ນ ຕາມທີ່ງນາ ແລະ ສວນຄົວ.



**ຊື່ຫ້ອງຖິ່ນ:** ໝາກເຄັ່ງ

**ຊື່ວິທະຍາສາດ:** *Dialium cochinchinense* Pierre.

**ຕະກຸນ:** FABACEAE

**ລັກສະນະພືດສາດ:**

ຕົ້ນໝາກເຄັ່ງໄມ້ຢືນຕົ້ນ ສູງ 15-30 ມ, ເປີອກລຳຕົ້ນສີເກີຈອົມນຳຕານແຕກເປັນເກັດ. ໃບປະສົມແບບຂົນນິກ ປາຍໃບຄົກ, ໃບຍ່ອຍມີ 5-9 ໃບ, ແຜນໃບຮູບທີ ຍາວ 4-7 ຊມ, ກວ້າງ 1-4 ຊມ, ກົກໃບມືນ, ຂອບໃບລູບ, ປາຍໃບແຫຼມ, ໃບສີຂຽວກັງ ຫຼື ມີຂົນບາງງ. ຊໍດອກແບບແຍກຂະແໜງ ອອກຕາມຊອກໃບ ຫຼື ປາຍກົງ, ດອກສີຂາວ ຫຼື ສີເຫຼືອງອ່ອນ. ໝາກກົມໂສີຂຽວ ໝາກສຸກສິດໆ.

**ການນຳໃຊ້:**

ຍອດອ່ອນ, ໃບອ່ອນ ມີລົດຊາດສົ່ມນຳມາກົມກັບແຈ່ວ ຫຼື ກົມກັບລາບ. ໝາກດີບມີລົດຊາດ ຝາດມັນ ນຳແວ່ນມາຕົ້ນກົມ. ໝາກສຸກນຳມາປອກກົມນວນມີລົດຊາດຫວານ.

**ການກະຈາຍພັນ:** ຕົ້ນໝາກເຄັ່ງເກີດຕາມປ່າດົງ ແລະ ປ່າເລື່າ.



ຊື່ຫ້ອງຖິ່ນ: ໝາກແຕ້ງຟ້າ

ຊື່ວິທະຍາສາດ: *Solanum torvum* Sw.

ຕະກຸນ: SOLANACEAE

ລັກສະນະພືດສາດ:

ໝາກແຕ້ງຟ້າເປັນໄມ້ພູ່ມ ສູງ 1-2 ມ. ໃບຄ່ງວັຈີບແບບຮຽງສະຫຼັບ, ໃບຮູບຂີ ຫຼື ຮູບໄຂ່, ຍາວ 7-25 ຊມ, ກົວາງ 5-20 ຊມ, ກົກໃບມິນ ຫຼື ວໍາ, ຂອບໃບວໍາ ຫຼື ເປັນຄື່ນ, ປາຍໃບແໜ່ມ, ຜົວໃບຊາມີຂົນທັງສອງດ້ານ. ຊື່ດອກແບບກະຈຸກອອກຕາມຊອກໃບ ຫຼື ປາຍກົງ, ດອກສີຂາວ, ກາບດອກສີຂຽວ, ກົບດອກສີຂາວເຊື່ອມຕິດກັນເປັນຮູບດາວ, ເກສອນຜູ້ເຊື່ອມຕິດກັນສີເງື່ອງ. ໝາກນີ້ມີສີຂຽວ ເວລາແກ່ສິດຳ ມີແມ່ນແກ່ງຈຳນວນຫຼາຍ.

ການນຳໃຊ້:

ໝາກມີລິດຊາດຂົນອ່ອນ ຫຼື ນຳມາລວກເຮັດຊູບ, ລວກກັບປິນ, ກັບແຈ່ວ, ນຳໄປໄສເອະຫຼາມ, ອ່ອມ ແລະ ແກ້ງໜໍ່ໄມ້. ໝາກດີບຍັງນຳໄປພັນໜ່ງ ແລະ ໄສ່ແໜ່ນປາ. ຂາກນຳມາຕົ້ນນຳດື່ມ ເປັນຢາປົວລົງຂາວ.

ການກະຈາຍພັນ: ໝາກແຕ້ງຟ້າມີກະເວີດຕາມໄຮ່, ຕາມສ່ວນ ຫຼື ຕາມທຶງ.



ຊື່ຫ້ອງຖິ່ນ: ຜັກຈອງ (ຕ້າງຕີບ)

ຊື່ວິທະຍາສາດ: *Glochidion brunneum* Hook.f.

ຕະກຸນ: PHYLLANTHACEAE

ລັກສະນະພືດສາດ:

ຜັກຈອງເປັນໄມ້ພຸ່ມ ສູງ 1-4 ມ, ກົງຈ່າຍອ່ອນສີນໍ້າຕາມ. ໃບດຸວຈັບແບບຮຽງສະຫຼັບ, ໃບຮູບຂອບຂະໜານ ຫຼື ຮູບຮົມ, ຍາວ 10-20 ຊມ, ກວ້າງ 5-7 ຊມ, ກົກໃບແຫຼມ ຫຼື ມິນ, ຂອບໃບລົງບ, ປາຍໃບແຫຼມ, ແຜນໃບສີຂຽວໝາຄ້າຍໜ້ງ. ຊື່ດອກແບບກະຈຸກອອກຢູ່ຊອກໄປ, ດອກສີເຫຼືອງ, ໝາກກົມສີຂຽວ ໝາກສຸກສີສົ່ມ.

ການນຳໃຊ້:

ນຳເອົາຍອດ ແລະ ໃບອ່ອນ ມາກິນດີບກັບແຈ່ວ, ກັບບຶ່ນ ແລະ ກັບລາບ.

ການກະຈາຍພັ້ນ: ຜັກຈອງເກີດຕາມແຄມນຳ.



**ຊື່ທັງຖິ່ນ:** ສະເມັກ

**ຊື່ວິທະຍາສາດ:** *Syzygium antisepticum* (Blume) Merr. & L.M.Perry

**ຕະກຸນ:** MYRTACEAE

**ລັກສະນະພືດສາດ:**

ຜັກສະເມັກເປັນໄມ້ພຸ່ມ ສูງ 5-7 ມ, ລຳຕົ້ນບົດງົມ, ເປົອກລຳຕົ້ນສີນໍາຕານແດງ, ແຕກເປັນເຮັດແຜນບາງງາ. ໃບດົງວຈັບແບບກົງກັນຂ້າມ, ແຜນໃບຮູບຫອກ, ກົກໃບມືນ ຫຼື ແຫຼມ, ຂອບໃບລົງບ, ປາຍໃບແຫຼມ, ໃບສີຂຽວເຫຼືອມໃບອ່ອນສີນໍາຕານ ຫຼື ແດງ. ຊົ່ວໂກແບບກະຈຸກ ອອກຢູ່ຕາມຊອກໃບ ຫຼື ປາຍກົງ, ດອກສີຂາວ. ໝາກກົມມືນ ສີຂາວ ໝາກສຸກເປັນສິດຳ ຫຼື ສີແດງ.

**ການນຳໃຊ້:**

ຍອດອ່ອນມີລິດຊາດຝາດ ນຳມາກົນເປັນຜັກສິດກັບປິ່ນ, ກັບແຈ່ວປາແດກ, ກັບລາບ ແລະ ພັນແໜມເຂົ້າ. ເປັນຜັກທີ່ນຳມາຂາຍເປັນສິນຄ້າຕາມທັງຕະຫຼາດ. ໃບແກ່ນໍມາຕຳໄພະຕາມຂໍ ແກ້ວກາການເຈັບບວມ.

**ການກະຈາຍພັນ:** ຜັກສະເມັກເກີດຕາມປ່າເລົ່າ ແລະ ປ່າໂຄກ.



ຊື່ຫ້ອງຖິ່ນ: ສ້ານ (ປຶ້ມ)

ຊື່ວິທະຍາສາດ: *Dillenia indica* L.

ຕະກຸນ: DILLENIACEAE

ລັກສະນະພືດສາດ:

ຕົ້ນໝາກສ້ານ ເປັນໄມ້ຢືນຕົ້ນ ສູງ 8-10 ມ. ໃບຄ່ງວ ຈັບແບບລົງງສະຫຼັບ, ແຜນໃບຮູບຂອບຂະໜານ ຫຼື ຮູບໄຂ່ຢືນ, ກວ້າງ 12-16 ຊມ, ຍາວ 20-30 ຊມ. ກົກໃບຮູບລື່ມ, ຂອບໃບແຊກແຂວເລື່ອຍ, ປາຍໃບມິນ, ໃບສີຂຽວໝາ ຜົວໃບມີຂົນຊາ. ດອກຄ່ງວ ອອກຢູ່ປາຍກ່າງງ່າຍ ສີເຫຼືອງ, ກາບດອກມີ 6 ກາບ ສີຂຽວອ່ອນມີຂົນ. ກົບດອກມີ 5-6 ກົບ ສີເຫຼືອງຫຼືນງ່າຍ. ເກສອນຜູ້ມີຈຳນວນຫຼາຍ. ໝາກກົມອວບນໍ້າສີຂຽວ ໝາກເວລາສຸກສີເຫຼືອງອົມສົມ.

ການນຳໃຊ້:

ໝາກມີລິດຊາດສົມ ກົນກັບແຈ່ວ.

ການກະຈາຍພັນ: ຕົ້ນໝາກສ້ານ ເກີດຕາມປ່າເລື່າ ແລະ ປ່າໂຄກ.



ຊື່ຫ້ອງຖິ່ນ: ສອບແສບ (ໄປເລາຍ)

ຊື່ວິທະຍາສາດ: *Connarus semidecandrus* Jack

ຊື່ຕະກູນ: CONNARACEAE

ລັກສະນະພື້ນສາດ:

ສອບແສບເປັນເຄື່ອ, ລຳຕົ້ນກົມ, ກົງງ່າວ່ອນສີສົມ. ໃປປະສົມແບບຂົນນິກ, ຈັບແບບລົງງ  
ສະຫຼັບ, ໃປຢ່ອຍ 3-7 ໃປ, ກ້ານໃບສັນ, ໃປຢ່ອຍຮູບຮີ ຫຼື ໃປຮູບຫອກ ຍາວ 8-22 ຊມ,  
ກວ້າງ 4-8 ຊມ, ກົກໃບມິນ, ຂອບໃບລົງປ, ບາຍແຫຼມ, ໃປ່ອນສິນ້າຕານ, ໃປແກ່ສີຂຽວ  
ຜົວໃບມັນເງື້ອມ. ຊື່ດອກແບບແຕກຂະແໜ່ງ ອອກຢູ່ປາຍຍອດ. ດອກສີຂາວ ຫຼື ສິນ້າຕານ  
ອ່ອນມີຂົນ. ກາບດອກຮູບໄຂ່ ຫຼື ຮູບຮີ ມີຂົນ, ກົບດອກຮູບຂອບຂະໜານສີຂາວ. ໝາກຮູບ  
ເຄື່ງດວງເດືອນ, ເປືອກບາງສີຂຽວ ເວລາສຸກສີສົມ.

ການນຳໃຊ້:

ຍອດອ່ອນນຳມາກິນເປັນຜັກສິດ ມີລົດຊາດຝາດ ກັບລາບ, ກັບແຈ່ວ. ໃປນຳໄປຕົ້ມລັງບາດ  
ແຜ່ນ້ຳຮ້ອນລວກ ຫຼື ໄຟໄໝ້. ເຄືອຕົ້ມດື່ມບໍາລຸງກຳລັງ.

ການກະຈາຍພັນ: ສອບແສບເກີດຕາມປ່າເລົ່າ ແລະ ປ່າໂຄກ.



**ຊື່ຫ້ອງຖິ່ນ:** ຜັກສົມ (ຜັກຕາກົງ, ຜັກບົງກົງ)

**ຊື່ວິທະຍາສາດ:** *Portulaca oleracea* L.

**ຕະກຸນ:** PORTULACACEAE

**ລັກສະນະພືດສາດ:**

ຜັກສົມ ເປັນພືດລົມລຸກ, ລຳຕົ້ນແຕກແບ່ງເລືອຕາມໜ້າດິນ, ລຳ ແລະ ກົງກົງສີຂຽວ ຫຼື ສີແດງ. ໃບດຸງວັຈັບແບບກົງກັນຂ້າມ ຫຼື ກົງວອງນ, ກັນໃບສັນ ແຜນໃບຮູບໄຂ່ເປັນ ຍາວ 1-2 ຊມ, ກວ້າງ 1-2 ຊມ, ກົກໃບແຫຼມ, ຂອບໃບລົງບສີບົວ, ປາຍໃບມິນ, ຜົວໃບດ້ານເທິງ ສີຂຽວ, ດ້ານລຸ່ມສີຂຽວອ່ອນເປັນນວນ. ຂໍ້ດອກແບບກະຈຸກ, ອອກຢູ່ປາຍຍອດ ຫຼື ຊອກໃບ, ດອກແຍກເພດໃນດອກງວກັນ, ດອກສີເຫຼືອງ, ກົບດອກມີ 4-5 ກົບ, ກາບດອກມີ 4-5 ກາບ.

**ການນຳໃຊ້:**

ຍອດອ່ອນນຳເອົາມາລວກກັບແຈ່ວ, ກັບເປັນ ແລະ ຊຸບກັບຜັກຊະນິດອື່ນໆ. ນອກຈາກນີ້ ໃບ ສົດຕຳຄັ້ນເອົານຳ ປະສົມນຳຕານ ແລະ ນຳເຜີ້ງ ດື່ມແກ້ວການຮ້ອນໃນ.

**ການກະຈາຍພັນ:** ຜັກສົມເກີດຕາມທຶນນາ, ແຄມນຳ ແລະ ຕາມສວນຄົວ.



ຊື່ຫ້ອງຖິ່ນ: ສົ່ມຂີ້ມ້ອນ

ຊື່ວິທະຍາສາດ: *Embelia ribes* Burm.f.

ຕະກຸນ: PRIMULACEAE

ລັກສະນະພິດສາດ:

ສົ່ມຂີ້ມ້ອນ ເປັນໄມ້ເຕືອ. ໃບດັ່ງວັນຈັບແບບຮຽງສະຫຼັບ, ກັານໃບຢາວ 1-2 ຊມ, ແຜນໃບຮູບ ຂອບຂະໜານແກມ ຫຼື ຮູບຮີ ຍາວ 3-8 ຊມ, ກວ້າງ 1-3 ຊມ, ໂຄນໃບມືນ, ຂອບໃບລົງບ, ປາຍໃບແຫຼມ, ໃບສີຂຽວເຫຼືອມມັນ, ຊຳດອກແບບແຕກຂະແໜງອອກຈາກຊອກໃບ ຫຼື ປາຍ ຍອດ, ດອກສີຂາວ ຫຼື ເຫຼືອງອ່ອນ. ກາບດອກມີ 5 ກາບ ສີຂຽວ ຫຼື ສີເຫຼືອງອ່ອນມີຂົນ. ກົກກົບດອກເຊື່ອມຕິດກັນປາຍແຍກເປັນແສກຮູບຮີສີຂາວ. ໝາກມືນ ຫຼື ກົມຮີ ສີຂຽວ ເລົາ ສຸກສີແດງ ຫຼື ສີດຳ.

ການນຳໃຊ້:

ຍອດອ່ອນມີລົດຊາດສົ່ມກິນເປັນຜັກສິດ ກັບບຶ່ນ, ເອາະ, ລາບ. ໃບນໍາມາຕົ້ນດື່ມ ເປັນຢາ ລະບາຍ, ລໍານຳໄປຕົ້ນດື່ມ ແກ້ວາການປັດສະວະຊຸມ, ຫົ້ວ, ຂ່ວຍແກ້ວາການໄອ.

ການກະຈາຍພັນ: ສົ່ມຂີ້ມ້ອນເກີດຕາມປ່າໂຄກ.



**ຊື່ຫ້ອງຖິ່ນ:** ສົມປ່ອຍ, (ຍະໄລ, ສະຫວາດ)

**ຊື່ວິທະຍາສາດ:** *Acacia concinna* (Willd.) DC.

**ຕະກຸນ:** FABACEAE

**ລັກສະນະພືດສາດ:**

ສົມປ່ອຍເປັນໄມ້ເຄືອ, ກົງງ່າວ່ອນມີໜາມ ແລະ ມີຂຶນ. ໃບປະສົມແບບຂົນນິກ, ຈັບແບບ ນຽງສະຫຼັບ, ໃບຍ່ອຍ ມີ 10-35 ຊູ້, ຮູບຂອບຂະໜານ, ຍາວ 3-12 ມມ, 1-3 ມມ, ໂຄນໃບ ມືນ, ຂອບໃບລູງປ, ປາຍໃບຕິ່ງໜາມ. ຊື່ດອກລວມແບບກະຈ່າງ. ດອກຂະໜາໝາດນັ້ນອຍ ສີຂາວ. ກີກກາບດອກເຊື້ອມຕິດກັນເປັນຮູບທົວຍ ສີແດງ. ກີກກີບດອກເຊື້ອມຕິດກັນເປັນ ບູອດສີຂາວ. ໝາກເປັນຜົກແປສີຂງວ ເວລາແກ່ສີດຳ.

**ການນຳໃຊ້:**

ພອດອ່ອນມີລິດຊາດສົມ ນຳມາແກ້ໄສໄກ່ ແລະ ປາ. ເປືອກນຳມາແຊັ້ນນຳດື່ມ ເຮັດໃຫ້ຊຸ່ມຄໍ ແກ້ໄອ, ອາກໃຊ້ຕົ້ມນຳດື່ມແກ້ ອາການເຈັບຫ້ອງ.

**ການກະຈາຍພັນ:** ສົມປ່ອຍເກີດຕາມປ່າເລົ່າ.



ຊື່ທັງຖິ່ນ: ສົມພື້ມ

ຊື່ວິທະຍາສາດ: *Streblus asper* Lour

ຕະກຸນ: MORACEAE


ລັກສະນະພື້ນສາດ:

ຕົ້ນສົມພື້ມເປັນໄມ້ຢືນຕົ້ນ ສູງ 5-7 ມ, ເບີອກລຳຕົ້ນເປັນເກົດສີເຫິດ, ກົງອ່ອນມີຂົນ. ໃບດູງວ  
ຈັບແບບລົງສະຫຼັບ, ແຜນໃບຮູບຮີ ຫຼື ຮູບໄຂ່ຢືນ, ຍາວ 4-8 ຊມ, ກວ້າງ 2-4 ຊມ, ກົກໃບ  
ມືນ, ຂອບໃບແຊກແຂວ້ເລື່ອຍ, ປາຍໃບແຫຼມ, ໃບສີຂຽວໝາຊາ. ດອກແຍກເພດ ແຕ່ຮ່ວມ  
ຕົ້ນ ອອກຕາມກົງງ່າ ແລະ ຊອກໄປ, ດອກສີເຫຼືອງ. ກາບດອກມີ 4 ກາບ ສີຂຽວອ່ອນ ມີ  
ຂົນ. ໝາກກົມຮີ ສຸກສີສົ່ມ ຫຼື ສີເຫຼືອງ.

ການນຳໃຊ້:

ກົນໝາກສຸກ ທີ່ມີລົດຊາດຫວານ. ໃບນຳມາປັງ ແລະ ຊົງນຳດື່ມ ເປັນຢາລະບາຍ.

ການກະຈາຍພັນ: ສົມພື້ມເກີດຕາມປ່າເລົ່າ ແລະ ປ່າດົງ.



ຊື່ຫ້ອງຖິ່ນ: ສົມພິດ

ຊື່ວິທະຍາສາດ: *Rhus chinensis* Mill.

ຕະກຸນ: ANACARDICEAE

ລັກສະນະພິດສາດ:

ສົມພິດເປັນໄມ້ຢືນຕົ້ນ ສູງ 5-7 ມ, ກົງອ່ອນ ແລະ ກັານໃບສີແດງມີຂົນ. ໃບປະສົມ, ໃບຍ່ອຍຮູບໄຂ່ ຫຼື ຮູບຮີ, ກົກໃບມິນ, ຂອບໃບລົງບ, ປາຍໃບຮຽວແຫຼມ, ໃບສີຂຽວມີຂົນ. ຊໍ່ ດອກແບບແຕກຂະແໜງມີຂົນ, ດອກສີຂາວ. ພາກສີຂຽວ ເວລາສຸກສີແດງ.

ການນຳໃຊ້:

ເຄີຍໝາກແກ່ງມາຕຳປະສົມເກືອ ກິນເປັນໝາກສົມ.

ການກະຈາຍພັນ: ສົມພິດເກີດຕາມປ່າເລົ່າ ແລະ ປ່າໂຄກ.



ຊື່ທັງຖິ່ນ: ສົມມ

ຊື່ວິທະຍາສາດ: *Terminalia chebula* Retz.

ຕະກຸນ: COMBRETACEAE

ລັກສະນະພືດສາດ:

ຕົ້ນສົມມເປັນໄມ້ຢືນ ຕົ້ນສູງ 10-20 ມ, ຮັງງ່າ ແລະ ຍອດອ່ອນມີຂຶນ. ໃບຄ່ງວ ຈັບແບບ  
ຮຽງສະຫຼັບ, ກ້ານໃບມືຕ່ອມ, ໃບຮູບທີ ຍາວ 8-15 ຊມ, ກວາງ 6-10 ຊມ, ກົກໃບມືນ,  
ຂອບໃບລົງບ, ປາຍໃບແຫຼມ, ແຜນໃບສີຂູງວ. ຂໍ້ດອກແບບກະຈຸກ ອອກຕາມຊອກໃບ ຫຼື  
ປາຍກຳງ່າ. ດອກສີເຫຼືອງມີຂຶນ. ໝາກຮູບທີກົມກັງ.

ການນຳໃຊ້:

ໝາກມີລິດຊາດສົ້ມຂຶນ ແລະ ຝາດ ກົນເປັນໝາກສົ້ມກັບແຈ່ວ.

ການກະຈາຍພັນ: ຕົ້ນສົ້ມມມັກເກີດຕາມປ່າໂຄກ.



**ຊື່ທີ່ຖື່ນ:** ເຄືອສິມລົມ

**ຊື່ວິທະຍາສາດ:** *Aganonerion polymorphum* Pierre ex Spire

**ຕະກຸນ:** APOCYNACEAE

**ລັກສະນະພືດສາດ:**

ສິມລົມເປັນໄມ້ເຄືອ, ທຸກພາກສ່ວນມີຢາງສີຂາວ, ກົງງ່າວອ່ອນມີຂຶນ. ໃບດູງຈຳບແບບ  
ກົງກັນຂ້າມ, ໃບຮູບໄຂ່, ຮູບທອກ ຫຼື ຮູບຮີ, ຍາວ 4-9 ຊມ, ກວ້າງ 2-4 ຊມ, ໂຄນໃບມືນ  
ຫຼື ວຳຮູບຫົວໃຈ, ຂອບໃບລົງປ, ປາຍໃບແຫຼມ ຫຼື ມືນ, ຜົວໃບດັນເທິງເຫຼືອມມັນ, ທ້ອງຜົວ  
ໃບດັນລຸ່ມມີຂຶນ, ໃບອ່ອນມີຂຶນ. ຂໍດອກແບບແຍກຂະແໜ່ງອອກຢູ່ຊອກໃບ ຫຼື ປາຍກົງ,  
ດອກສີບົວ, ມີຂະໜາດນ້ອຍຈຳນວນຫຼາຍ, ໝາກມືນກົມສີຂຽວ.

**ການນຳໃຊ້:**

ຍອດອ່ອນມີລິດຊາດສິມນຳເອົາໃບອ່ອນມາແກງໃສ່ປາ. ລຳຕົ້ນຕົ້ມດື່ມ ຫຼື ນຳໃບມາຄັງວິ່ນ  
ແກ້ວການວິນວຽນ.

**ການກະຈາຍພັນ:** ສິມລົມເກີດຕາມປ່າໂຄກ ແລະ ປ່າເລື່າ.



ຊື່ທົ່ວເຖິງ: ສົມໄກ່ຍ

ຊື່ວິທະຍາສາດ: *Ampelocissus* sp.

ຕະກຸນ: VITACEAE

ລັກສະນະພືດສາດ:

ສົມໄກ່ຍເປັນໄມ້ເຄືອ, ມີມີເກາະ, ຕາມລຳຕົ້ນເປັນຮ່ອງ, ກິງງ່າວອ່ອນມີຂຶນ. ໃບດູງວົຈ່ບແບບ  
ຮຽງສະຫຼັບ, ໃບຮູບຫົວໃຈ, ກົກໄປວ້າຮູບຫົວໃຈ, ຂອບໃບແບບແຂວ້ເລື່ອຍ, ປາຍໃບແຫຼມ,  
ໃບສີຂຽວ ຜົວໃບດ້ານເທິງກັງງ, ຜົວໃບດ້ານລຸ່ມມີຂຶນ. ຊໍດອກແບບແຍກຂະແໜງ, ອອກ  
ກົງກັນຂ້າມກັບໃບ ຫຼື ຕາມຂໍ້ຂອງເຄືອ. ດອກສີຂາວບິນສີເຫຼືອງອ່ອນ. ໝາກມົນກົມສີຂຽວ,  
ໝາກສຸກສິມ່ວງ ຫຼື ສິດຳ.

ການນຳໃຊ້:

ຍອດອ່ອນມີລິດຊາດສົມກົນກັບປິນ ແລະ ກົນກັບແຈ່ວ.

ການກະຈາຍພັນ: ສົມໄກ່ຍເກີດຕາມປ່າດົງ.



ຊື່ຫ້ອງຖິ່ນ: ສົມແສງ (ຕົ້ນແສງ)

ຊື່ວິທະຍາສາດ: *Xanthophyllum flavescens* Roxb.

ຕະກຸນ: XANTHOPHYLLACEAE

ລັກສະນະພື້ນສາດ:

ສົມແສງເປັນໄມ້ພຸ່ມ ລຳຕົ້ນສືນນຳຕານ. ໃບຄ່ງວ ຈັບແບບລຽງສະຫຼັບ, ແຜນໃບຮູບຂອບຂະໜານ ຫຼື ຮູບຮີ, ຍາວ 10-18 ຊມ, ກວ້າງ 4-8 ຊມ, ກົກໃບມິນ, ຂອບໃບລຽບ, ປາຍໃບແໜ່ມ, ໃບສີຂຽວເຫຼື້ອມມັນ ໃບອ່ອນສີສົມ.

ການນຳໃຊ້:

ຍອດອ່ອນມີລິດຊາດມັນ ນຳມາກຶນເປັນຜັກສິດ ກັບລາບ, ກັບປິ່ນ ແລະ ເຈົ້ວປາແດກ.

ການກະຈາຍພັນ: ສົມແສງເກີດຕາມແຄມນຳ.



ຊື່ຫ້ອງຖິ່ນ: ຜັກສັງ (ຜັກແກວ)

ຊື່ວິທະຍາສາດ: *Peperomia pellucida* (L.) Kunth

ຕະກຸນ: PIPERACEAE

ລັກສະນະພິດສາດ:

ຜັກສັງເປັນພິດລົ້ມລຸກ ສູງ 15-20 ຊມ, ລຳຕົ້ນ ແລະ ກິງການອວບນັ້ນ ສີຂຽວອ່ອນ ຫຼື ສີສົ້ມອ່ອນ. ໃບດັ່ງວ ຈັບແບບຮຽງສະຫຼັບ, ການໃບຍາວ 1-2 ຊມ, ແຜ່ນໃບຮູບທົວໃຈ, ຍາວ 1-4 ຊມ, ກວາງ 1-3 ຊມ, ກົກໃບວັນ ຫຼື ມິນ, ຂອບໃບລຽບ, ປາຍໃບແຫຼມ, ຜົວໃບດັນ ເທິງເຫຼືອມມັນສີຂຽວ ຫຼື ຂຽວອ່ອນ. ຊົ່ວໂມງແບບຮວງຕັ້ງ ອອກຢູ່ປາຍຍອດ ແລະ ຂອກໃບ, ອອກນ້ອຍມີຈຳນວນຫຼາຍ ອອກຕາມແການຊື່ດອກ.

ການນຳໃຊ້:

ຍອດອ່ອນມີລິດຊາດຫວານນຳມາເຮັດແກງ, ຍຳ ແລະ ຊຸບ. ໃບນຳມາຄັ້ນນຳດື່ມ ແກ້ວາ ການເຈັບຫ້ອງ, ຕຳໂພະໄສ່ຝຶ ແລະ ບາດແຜ່ທີ່ເປັນໜ້ອງ ຫຼື ຜົນຄັນ ຂ່ວຍຮັກສາອາການ ໄດ້.

ການກະຈາຍພັນ: ຜັກສັງເກີດຕາມແຄມນັ້ນ, ແຄມບ້ານ ແລະ ຕາມສ່ວນ ບໍ່ອນມີຄວາມຊຸ່ມ.



ຊື່ຫ້ອງຖິ່ນ: ຜັກໄສ

ຊື່ວິທະຍາສາດ: *Momordica charantia* L.

ຕະກຸນ: CUCURBITACEAE

ລັກສະນະພືດສາດ:

ຜັກໄສເປັນພືດເຄືອ ມີມີເກາະ, ລຳຕົ້ນເປັນລົງມີຂົນປົກຄຸມ. ໃບດັ່ງວິຈັບແບບລົງສະຫຼັບ,  
ກັນໃບຍາວ 5-7 ຊມ, ມີເກາະອອກຢູ່ຫຼືບໃບ. ແຜນໃບຄ້າຍຮູບຝາມີ, ຍາວ 4-5 ຊມ, ກວ້າງ  
5-6 ຊມ. ກົກໃບວຳ, ຂອບໃບວຳເລີກ 5-7 ແສກ, ບາຍໃບແຫຼມ, ມີເສັ້ນໃບ 3-5 ເສັ້ນ, ໃບ  
ສີຂູງມີຂົນ. ດອກດັ່ງວແຍກເພດຢູ່ຕົ້ນດູງວກັນ, ດອກສີເຫຼືອງອ່ອນ, ອອກຢູ່ຊອກໃບ, ກາບ  
ດອກມີ 5 ກາບ ສີຂູງອ່ອນ ຫຼື ສີເຫຼືອງ, ກົບດອກມີ 5 ກົບ ສີ ເຫຼືອງອ່ອນ. ໝາກຮູບຫຼື,  
ເນື້ອໝາກອ່ອນນຸ່ມສີຂູງ ເວລາສຸກສີສົ່ມ ຫຼື ສີເຫຼືອງ, ຜິວເປັນຕູດ. ແກ່ນມີໝາຍ ສິນໍາຕາມ.

ການນຳໃຊ້:

ຍອດ, ໃບອ່ອນ ແລະ ໝາກນຳມາກິນເປັນຜັກສິດ ຫຼື ລວກກັບແຈ່ວ, ກັບບິນ, ກັບລາບ,  
ນຳມາແກງໃສ່ຂຶ້ນ ແລະ ໄສ່ເຫັດປວກ ມີລິດຊາດຂົມຫວານ. ຜັກໄສນຳມາຕົ້ນກິນຢັ້ງເປັນຢາ  
ຮັກສາໂລກທອບຫຼືດ, ຂ່ວຍຈະເລີນອາຫານ ແລະ ລົດນຳຕານໃນເລືອດ.

ການກະຈາຍພັນ: ຜັກໄສແຄມນາ, ບ່າເລົ່າ ແລະ ແຄມສວນ.



ຊື່ຫ້ອງຖິ່ນ: ເຄືອໄສຕັນ

ຊື່ວິທະຍາສາດ: *Amphineurion marginatum* (Roxb.) D.J.Middleton

ຕະກຸມ: APOCYNACEAE

ລັກສະນະພືດສາດ:

ເຄືອໄສຕັນເປັນໄມ້ເຄືອ, ທຸກພາກສ່ວນມີຢາງສີຂາວ. ໃບດັ່ງວິຈັບແບບກົງກັນຂ້າມ, ກັນໃບສັ້ນ ສີບິວ, ແຜນໃບຮູບຂອບຂະໜານ, ຍາວ 6-8 ຊມ, ກວ້າງ 2-3 ຊມ, ກົກໃບມືນ, ຂອບໃບລົງບົບ, ປາຍແຫຼມ, ໃບສີຂຽວເຫື່ອມມັນ. ຊົ່ວໂມງອອກຕາມຊອກໃບ ຫຼື ປາຍກົງ, ດອກສີຂາວ. ກົກກາບດອກເຊື້ອມຕິດກັນ ເປັນຮູບຖ້ວຍສີຂຽວອ່ອນ. ກົກກົບດອກເຊື້ອມຕິດກັນເປັນໝາດປາຍແພກເປັນແສກສີຂາວ.

ການນຳໃຊ້:

ຍອດອ່ອນນຳເອົາມາແກງໃສ່ໄກ່.

ການກະຈາຍພັນ: ເຄືອໄສຕັນເກີດຕາມເກີດຕາມປ່າໄຕກ.



ຊື່ຫ້ອງຖິ່ນ: ຜັກຊອຍຈຳ (ຫາງໝາ)

ຊື່ວິທະຍາສາດ: *Conyza albida* Willd. ex Spreng.

ຕະກຸນ: ASTERACEAE

ລັກສະນະພື້ນສາດ:

ເປັນພື້ນລົມລຸກ ສູງ 30-80 ຊມ, ລຳຕົ້ນກົມອວບ. ໃບຄ່ງວ ຈັບແບບລົງສະຫຼັບ, ກັນໃບສັ້ນ, ແຜນໃບຮູບກົມສ້ວຍ ຍາວ 20-25 ຊມ, ກວ້າງ 2-4 ຊມ, ປາຍໃບແຫຼມ, ຂອບໃບແບບແຂວ່ເລື່ອຍ, ກົກໃບຮຽວແຫຼມ. ຊື່ດອກແບບກະຈຸກແນ້ນ ອອກຢູ່ປາຍຍອດ ຫຼື ຊອກໃປ.

ການນຳໃຊ້:

ຍອດອ່ອນນຳເອົາມາແກງໃສ່ຊື້ນ ແລະ ນຳມາລວກກົນກຳບແຈ່ວ ແລະ ອາຫານປະເພດ ທີ່ນູ້.

ການກະຈາຍພັນ: ຜັກຊອຍຈຳເກີດຕາມບ່ອນທີ່ມີແສງແດດ ແລະ ດິນປົງກາຊຸ່ມ.



ຊື່ທັງຖິ່ນ: ຊາຍຊູ້

ຊື່ວິທະຍາສາດ: *Capparis zeylanica* L.

ຕະກຸນ: CAPPARIDACEAE

ລັກສະນະພິດສາດ:

ຊາຍຊູ້ເປັນພິດເຄືອ, ລຳຕົ້ນສີເຫຼາ ຕາມຂໍ້ມື້ນາມ. ໃບຄົງວ ຈັບແບບຮຽງສະຫຼັບ, ໃບຮູບຂອບຂະໜານ, ຮູບທອກ ຫຼື ຮູບໄຂ່ເປັນ, ຍາວ 10–20 ຊມ, ກວ້າງ 3–15, ກົກໃບມິນ ຫຼື ແຮູມ, ຂອບໃບເປັນແຊກ, ປາຍໃບມິນ ຫຼື ແຮູມ, ແຜນໃບສີຂຽວເປັນມັນເຫຼືອມ. ຊົ່ວໂມງ ອອກເປັນກະຈຸກ ມີ 2–5 ດອກ, ອອກຢູ່ຊອກໃບ, ດອກສີຂາວປິນສີເຫຼືອງ ຫຼື ສິມ່ວງ. ກາບ ດອກມີ 4 ກາບ, ຮູບໄຂ່ ຫຼື ຮູບຂອບຂະໜານ. ກົບດອກມີ 4 ກົບ, ຮູບຂອບຂະໜານ, ກົບ ຄຸ່ເຫຼົງສີເຫຼືອງປິນຂາວ, ກົບຄຸ່ລຸ່ມສີຂາວປິນມ່ວງ, ຫຼືນ່າຍ. ເກສອນຜູ້ມີ 20–30 ອັນ. ໝາກ ຮູບທີ່ ສີຂຽວເຫຼືອມ ໝາກສຸກສີແດງ ຫຼື ສິມ່ວງ.

ການນຳໃຊ້:

ໝາກສຸກກິນໄດ້ ມີລິດຊາດຫວານ. ຮາກຕົ້ນນຳດື່ມ ເປັນຢາບໍາລຸງການໄຫວ່ງນເລື້ອດ, ໄລ່ ລົມໃນກະເພາະ, ເປັນຢາບໍາລຸງຫຼັງເກີດລູກ ຂ່ວຍໃຫ້ມິດລູກເຂົ້າອູ້, ແກ້ວາການໄອຊຳເຮືອ. ລຳຕົ້ນຕົ້ນນຳດື່ມແກ້ວາການຝຶກຊຳ ໄລ່ນໍ້າຢາງເຫຼືອງ. ໃບນຳມາຕົ້ນອາບແກ້ໄລກຜົວໜັງ.

ການກະຈາຍພັນ: ປ່າເລົ່າ ແລະ ປ່າໂຄກ.



**ຊື່ຫ້ອງຖິ່ນ:** ຜັກດາງຂົມ

**ຊື່ວິທະຍາສາດ:** *Glinus oppositifolius* (L.) DC.

**ຕະກຸນ:** MOLLUGINACEAE

**ລັກສະນະພືດສາດ:**

ຜັກດາງຂົມເປັນພືດລົມລູກ ລຳຕົ້ນແຕກແໜງເລືອຕາມໜ້າດິນ, ລຳຕົ້ນ ແລະ ຮັ້ງ ສີຂຽວ ຫຼື ສີແດງ. ໃບດັ່ງວ່າ ສີຂຽວຈັບແບບອົມຮອບຢູ່ຂໍ້ 4-5 ໃປ, ກັບນີ້ໃບສັ້ນ, ແຜ່ນໃບຮູບທອກ ຫຼື ອູບຮູບ ຍາວ 1-2 ຊມ, ກວ້າງ 3-5 ມມ, ກົກໄປຮຽວແໜຸມ, ຂອບໃບລົງປ, ປາຍໃບມິນ ຫຼື ແໜຸມ, ໃບສີຂຽວ. ດອກດັ່ງວ່າສີຂາວ ອອກຢູ່ບໍລິເວັນຂໍ້ 4-5 ດອກ. ໝາກຮູບຮູບ.

**ການນຳໃຊ້:**

ຫຼຸກພາກສ່ວນສາມາດກິນໄດ້ ມີລົດຊາດຂົມຫວານ ນຳໄປແກ້ງໃສ່ປາ. ຜັກດາງຂົມຍັງໃຊ້ເປັນ ພາ ເຊັ່ນ: ເອົາໝົດຕົ້ນ ຕົ້ນນຳດື່ມແກ້ກັອນໃນ, ແກ້ວັດ, ແກ້ໄອ, ບັນເທິອາການເຈັບຫົວ. ນອກຈາກນັ້ນຍັງໃຊ້ຕຳໂພະໃສ່ປາດແຜ່ ຫຼື ບໍລິເວັນ ຫຼື ມີອາການບວມຊຳ ອັກເສບ ແລະ ແກ້ວາການຄັ້ນ.

**ການກະຈາຍພັນ:** ຜັກດາງຂົມເກີດຕາມທຶນາ, ແຄນນຳ ແລະ ຕາມສວນ ບໍ່ອນດິນຊຸ່ມ.



**ຊື່ຫ້ອງຖິ່ນ:** ໝາກເດືອກງັງ

**ຊື່ວິທະຍາສາດ:** *Ficus racemosa* L.

**ຕະກຸນ:** MORACEAE

**ລັກສະນະພືດສາດ:**

ເປັນໄມ້ຢືນຕົ້ນ ສູງ 10-20 ມ, ລຳຕົ້ນກັງງ ເປົ້ອກນອກສິນນໍາຕາມບົນສີເຫຼົາ, ບຸກພາກສ່ວນມີຍາງສີຂາວ. ໃບດັ່ງວ ຈັບແບບລົງງສະຫຼັບ ມີກ້ານໃບຍາວສິນນໍາຕາມ, ແຜນຮູບໄຂ່ ຫຼື ຮູບທອກ, ກົກໃບມືນ, ຂອບໃບລົງປ, ປາຍໃບແຫຼມ, ໃບສີຂຽວເຫຼື້ອມ. ຊຶ່ດອກແບບກະຈຸກ ອອກຕາມລຳຕົ້ນ ຫຼື ກິ່ງງ່າ. ໝາກມີນສີຂຽວ ເວລາໝາກສຸກສີແດງ.

**ການນຳໃຊ້:**

ຍອດອ່ອນ ແລະ ໝາກອ່ອນ ທີ່ມີລົດຊາດຝາດ ນຳມາກິນກັບລາບ, ກັບບິ່ນ ແລະ ແຈ່ວປາແດກ.

**ການກະຈາຍພັນ:** ມັກເກີດຕາມແຄມນໍ້າ ແລະ ບ່າດົງ.



**ຊື່ທັງຖິ່ນ:** ໝາກຕັ້ງ

**ຊື່ວິທະຍາສາດ:** *Sandoricum koetjape* (Burm. f.) Merr.

**ຕະກຸນ:** MELIACEAE


**ລັກສະນະພື້ນສາດ:**

ໄມ້ຢືນຕື້ນ, ສູງ 10–20 ມ, ເປືອກສີເຫຼົາອົມສິນໍາຕາມ. ໃບປະກອບແບບຂຶນນິກ ມີ 3 ໃບ  
ຍ່ອຍ, ແຜນໃບຮູບໄຂ່ ຫຼື ຮູບຮີ, ຍາວ 10–20 ຊມ, ກ້ວາງ 13–15 ຊມ, ກົກໃບມິນ ຫຼື  
ບັງວ, ຂອບໃບລົງບ ຫຼື ເປັນຕື້ນ, ປາຍໃບມິນ, ໃບສີຂຽວໝາ ມີຂົນ. ຊໍດອກແບບແຍກຂະ  
ແໜງອອກຕາມຊອກໄປ, ດອກສີຂຽວອົມສີເຫຼືອງອ່ອນ, ກາບດອກເປັນຮູບຖວຍ ສີຂຽວມີຂົນ,  
ກົບດອກມີ 5 ກົບ ສີຂຽວ ມີຂົນອ່ອນ. ໝາກມິນສີຂຽວ ເວລາສຸກສີເຫຼືອງ.

**ການນຳໃຊ້:**

ໝາກມີລິດຊາດສົ່ມຫວານ ກົນເປັນໝາກສົ່ມກັບແຈ່ວ.

**ການກະຈາຍພື້ນ:** ຕົ້ນໝາກຕັ້ງເກີດຕາມປ່າດົງ.



**ຊື່ທັງຖິ່ນ:** ຕາວຄົນ

**ຊື່ວິທະຍາສາດ:** *Wallichia gracilis* Becc.

**ຕະກຸນ:** ARECACEAE


**ລັກສະນະພືດສາດ:**

ຕາວຄົນເປັນໄມ້ພຸ່ມ ສູງ 2-3 ມ, ມີໜ່າງເສັ້ນໃຍ້ໂອບລຳຕົ້ນ. ກັານໃບແຂງໂອບຫຼຸມລຳຕົ້ນ ຍາວ 1-2 ມ. ໃບປະກອບແບບຂົນນິກ. ໃບຍ່ອຍຈັບແບບກົງກັນຂ້າມ, ແຜ່ນໃບຮູບຫອກ ຍາວ 30-40 ຊມ, ກວ້າງ 7-9 ຊມ, ກົກໃບແຫຼມ, ຂອບໃບລົງບ, ປາຍໃບເປັນແຊກແຂວ. ຊໍດອກອກແບບເປັນຮວງຫ້ອຍລົງ, ດອກແຍກເພດ. ໝາກຮູບໄຂ່ ຫຼື ຮູບຮີ ສີຂູງວ ເວລາ ສຸກສີເຫຼືອງ ແລະ ແດງ.

**ການນຳໃຊ້:**

ຍອດອ່ອນ ນຳມາອ່ອມ ແລະ ແກງໃສ່ຂຶ້ນ ຫຼື ປາ ມີລິດຊາດຫວານ ແລະ ຢັ້ງນຳມາເຜົາຕຳ ແຈ່ວ ເປັນອາຫານພື້ນເມືອງທີ່ປະຊາຊົນລາວນີ້ຢືນກິນ.

**ການກະຈາຍພັນ:** ເກີດຕາມພື້ນປ່າດົງ.



**ຊື່ທັງຖິ່ນ:** ຕົວສົມ

**ຊື່ວິທະຍາສາດ:** *Cratoxylum formosum* (Jack) Dyer

**ຕະກຸນ:** CLUSIACEAE

**ລັກສະນະພືດສາດ:**

ຕົວສົມເປັນໄມ້ຢືນຕົນ ສູງ 8-15 ມ, ລຳຕົນມີໜຳມາມ ເປືອກນອກສິນບໍ່ຕາມປິນດຳ ແຕກເປັນ ເກັດຕາມລວງຍາວ, ມີນ້ຳຢາງໝູງວສີແດງ. ໃບດຸ່ງວ ຈັບແບບກົງກັນຂ້າມ, ແຜນໃບຮູບທີ່ ຫຼື ອູບໄຂ່ຢືນ, ຍາວ 7-10 ຊມ, ກວ້າງ 3-4 ຊມ, ຂອບໃບລຽບ, ປາຍໃບແຫຼມ, ໃບສີຂຽວ, ໃບອ່ອນສີແດງອົມບົວ. ຂໍ່ດອກອກແບບກະຈຸກ ຕາມກົງງ່າ, ດອກສີແດງອົມສີບົວອ່ອນ, ມີ ກິ່ນຫອມ, ກາບດອກສີແດງ, ກີບດອກສີຂາວ. ໝາກຮູບທີ່ ເວລາແກ່ເຫັນຈະແຕກອອກ.

**ການນຳໃຊ້:**

ພອດອ່ອນ ແລະ ຂໍ່ດອກ ທີ່ມີລົດສົມ ໃຊ້ກິນເປັນຜັກສິດ ແລະ ນຳໄປແກ້ງໃສ່ປາ.

**ການກະຈາຍພັນ:** ຕົວສົມເກີດຕາມປ່າເລົ່າ, ປ່າໂຄກ.



**ຊື່ຫ້ອງຖິ່ນ:** ຜັກຕົມລົດ, ຜັກເຮືອເຫາະ

**ຊື່ວິທະຍາສາດ:** *Crassocephalum crepidioides* (Benth.). S. Moore

**ຕະກຸນ:** ASTERACEAE

**ລັກສະນະພືດສາດ:**

ຜັກຕົມລົດເປັນພືດລົມລຸກ ສູງ 40-70 ຊມ, ລຳຕົ້ນກົມອວບນໍ້າມີຂຶນ. ໃບດັງວ ຈັບແບບຮຽງ ສະຫຼັບ, ແຜ່ນໃບຮູບຮີ, ຍາວ 6-15 ຊມ, ກວ້າງ 3-6 ຊມ, ກົກໃບຮຽງແຫຼມແຄບເປັນກັນ ໃບ, ຂອບໃບເປັນແບບແຊກແຂວ້ວ ຫຼື ວໍາ, ບາຍໃບແຫຼມ, ໃບສີຂຽງ ແຜ່ນໃບດ້ານເທິງກັງ ດ້ານລຸ່ມມີຂຶນ. ຂໍດອກອອກແບບກະຈຸກສີຂາວແກມສີສົ່ມ, ອອກຢູ່ປາຍຍອດ. ພາກຮູບ ທ່ອນກົມ ມີຂຶນຢູ່ປາຍ.

**ການນຳໃຊ້:**

ຍອດອ່ອນນຳເອົາມາລວກກົມ, ກັບແຈ່ວ, ກັບປິ່ນ ແລະ ນຳໄປຊູບປະສົມກັບຜັກນິດອື່ນງ.

**ການກະຈາຍພັນ:** ຜັກຕົມລົດເກີດຢູ່ຕາມປ່າເງົ່າ, ທີ່ງນາ ແລະ ຕາມສວນຄົວ.



**ຊື່ຫ້ອງຖິ່ນ:** ຜັກຕິມຮູ້ງ

**ຊື່ວິທະຍາສາດ:** *Helminthostachys zeylanica* (L.) Hook.

**ຕະກຸນ:** OPHIOGLOSSACEAE

**ລັກສະນະພືດສາດ:**

ຜັກຕິມຮູ້ງເປັນພືດລົມລຸກ ມີເຫຼົ້າໃຕ້ດິນ. ໃບປະສົມແບບຂຶນນິກ ຫຼື ແບບຮູບຝາມ, ກ້ານໃບ 20-50 ຊມ, ໃບຍ່ອຍ ຍາວ 20-25 ຊມ, ກວ້າງ 2-5 ຊມ, ສີຂູງ ຫຼື ສິນ້າຕານແກມ ສິມ່ວງ. ໃບແກ່ມີກຸ່ມສະບັບຕິດຢູ່ເທິງກ້ານໃບ ແລະ ແຜ່ນໃບ.

**ການນຳໃຊ້:**

ຍອດອ່ອນນຳເອົາມາລວກມີລົດຊາດສົ່ມ ກິນກັບອາຫານ ແລະ ນຳໄປຊູບປະສົມກັບຜັກຊະນິດ ອື່ນ. ສ່ວນຮາກນຳໃຊ້ເປັນຢາ ພິນຫາແຜ່ເປື່ອຍ, ນຳຮອນລວກ, ໃບຕົ້ມນຳອາບສຳລັບແມ່ຢູ່ກຳ ຫຼັງເກີດລູກ.

**ການກະຈາຍພັນ:** ເກີດຕາມພື້ນປ່າ ບ່ອນທີ່ມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ໃນປ່າປະສົມ ແລະ ປ່າໂຄກ.



## ຊື່ທ້ອງຖິ່ນ: ຂວ້າມຕູບໝູບ

ຊື່ວິທະຍາສາດ: *Kaempferia rotunda* L.

## ព័ជរដ្ឋ: ZINGIBERRACEAE

ລັກສະນະພິດສາດ:

ທ້ວານຕູບໝູບເປັນພິດລົມລຸກ, ມີເຫຼົ້າເປັນທິວມີນ ມີກິ່ນຫອມ. ໃບດັ່ງວ່າ ຈັບແບບກັງວອງນ, ແຜ່ນໃບຮູບມີນ ຫຼື ຮູບໄຂ່, ປາຍໃບມີນ, ຂອບໃບລົງປ, ກົກໃບເວລາຍັງອ່ອນກໍ ຫຼື ມົວນ ເຂົ້າຫາກັນ ສີຂຽວແກມສີແດງ ຜົວໃບດ້ານເທິງກັງ ດ້ານລຸ່ມມີຂຶນອ່ອນ.

ການນຳໃຊ້:

ໃບອ່ອນນຳມາກິນເປັນຜັກສົດ ກິນກັບແກງໜໍໄມ້, ຊຸບໜໍໄມ້ ແລະ ແຈ່ວປາແດກ. ເທົ່າ  
ຮາກນຳໄປຕື່ມນຳດື່ມ ເປັນຢາແກ້ອກາການເຈັບຫ້ອງບິດ ຫ້ອງຍື່ງ ແລະ ປົວກະເພາະລຳໃສ້.

## ການກະຈາຍພັນ: ເກີດຕາມປ່າໂຄກ.



**ຊື່ຫ້ອງຖິ່ນ:** ໝາກຕຸມ

**ຊື່ວິທະຍາສາດ:** *Aegle marmelos* (L.) Corrêa

**ຕະກຸນ:** RUTACEAE

**ລັກສະນະພືດສາດ:**

ຕົ້ນໝາກຕຸມເປັນໄມ້ຢືນຕົ້ນ ສູງ 10–15 ມ, ເປືອກນອກລີເທິກແຕກເປັນແຊກຕື້ນໆ, ເນື້ອໄມ້ ມີກິ່ນຫອມ, ຕາມລຳຕົ້ນ ແລະ ກົງ່ງ່າມີໝາມ. ໃບປະສົມແບບຝາມີ ມີ 3 ໃບຍ່ອຍ, ໃບຍ່ອຍ ສູບໄຂ່ ຫຼື ສູບຮີ, ຍາວ 5–14 ຊມ, ກ້ວາງ 2–6 ຊມ, ສອງໃບລຸ່ມນ້ອຍກວ່າໃບເທິງ, ກົກໃບແຫຼມ, ຂອບໃບລົງບ ຫຼື ເປັນແຊກມິນ, ປາຍໃບແຫຼມ, ໃບສີຂຽວ ຜິວກັງ. ຊົ່ວໂມງແບບ ກະຈ່າງ ອອກຕາມປາຍກົງ ຫຼື ຂອກໃບ. ດອກສີຂາວອິມສີເຫຼືອງອ່ອນ ມີກິ່ນຫອມ. ໝາກ ມິນ ຫຼື ສູບຮີ ສີຂຽວ ເວລາສຸກສີເຫຼືອງ.

**ການນຳໃຊ້:**

ຍອດອ່ອນມີລິດຊາດຮືນ ກິນເປັນຜັກສິດກັບເອາະ ກັບຢືນ. ໝາກຕາກແຫ້ງ ຕົ້ນນັ້ນດີ່ມເປັນ ຢາແກ້ກ້ອງບິດ ແລະ ບໍາລຸງ.

**ການກະຈາຍພັນ:** ຕົ້ນໝາກຕຸມເກີດຕາມປ່າໂຄກ ແລະ ປ່າດົງ.



ຊື່ຫ້ອງຖິ່ນ: ຜັກຕີບ

ຊື່ວິທະຍາສາດ: *Monochoria hastata* (L.) Solms

ຕະກຸນ: PONTEDRIACEAE

ລັກສະນະພື້ນສາດ:

ເປັນພື້ນນໍ້າລອຍຕາມໜ້ານໍ້າ, ລຳຕົ້ນສັ້ນ, ຮາກຝອຍສີນໍ້າຕານ ຫຼື ແດງ ຈຳນວນຫຼາຍ. ໃບ  
ດົງວ ກັນໃບຍາວ 10-15 ຊມ, ອວບນໍ້າ ກົກກັນໃບໂພງອອກສີຂຽວ, ແຜ່ນໃບຮູບຫົວໃຈ  
ຍາວ 3-5 ຊມ, ກວ້າງ 2-3 ຊມ, ປາຍໃບແຫຼມ, ຂອບໃບລູປ, ກົກໃບວໍ້າ, ໃບສີຂຽວ  
ໝາຄ້າຍໜ້າເຫຼືອມມັນ. ຂໍ້ດອກແບບກະຈຸກ ອອກຢູ່ກົກກັນໃບ, ມີ 5-15 ດອກສິມ່ວງອ່ອນ,  
ມີໃບປະດັບຫຼຸມຂໍ້ດອກ ສູບໄຂ່ ສີຂຽວ.

ການນຳໃຊ້:

ຍອດອ່ອນ ແລະ ຂໍ້ດອກ ນຳມາລວກ ມີລົດຊາດຫວານ ກິນກັບປິ່ນ, ກັບແຈ່ວ ແລະ ນຳໄປ  
ຊູບປະສົມກັບຜັກຊະນິດອື່ນງ.

ການກະຈາຍພັນ: ຜັກຕີບເກີດຕາມແຄມນໍ້າ ຕາມຫ້ອຍ ບົງ ແລະ ໜ້ອງນໍ້າຕ່າງໆ.



**ຊື່ຫ້ອງຖິ່ນ:** ຕົ້ນໝາກແຕ້

**ຊື່ວິທະຍາສາດ:** *Afzelia xylocarpa* (Kurz) Craib

**ຕະກຸມ:** FABACEAE

**ລັກສະນະພືດສາດ:**

ຕົ້ນໝາກແຕ້ເປັນໄມ້ຢືນຕົ້ນ ສູງ 10-15 ມ, ລຳຕົ້ນກົມ. ໃບປະສົມແບບຂົນນິກ ຈັບແບບ ກົງກັນຂຳມ, ມີໃບຢ່ອຍ 3-5 ອຸ່ນ, ແຜນໃບຢ່ອຍຮູບໄຂ່ ຫຼື ຮູບຂອບຂະໜານ, ຍາວ 4-9 ຊມ, ກວ້າງ 2-5 ຊມ, ກົກໃບມິນ, ຂອບໃບລົງບ, ປາຍໃບແຫຼມ, ແຜນໃບສີຂຽວກັງງ. ດອກ ເປັນຊື່ແບບກະຈ່າງ ມີ 4-10 ດອກ ອອກຢູ່ປາຍຍອດ, ດອກສີຂຽວອ່ອນແກມສີແດງມີຂົນ, ກາບດອກເປັນຮູບເຮືອ ສີຂຽວອົມແດງ, ກີບດອກດ້ານນອກສີເຫຼືອງອ່ອນ ດ້ານໃນສີເຫຼືອງ ແກມສີບົວ. ໝາກເປັນຜັກແປຄ້າຍດາບໝາກອ່ອນສີຂຽວ ໝາກສຸກສີນໍາຕາມ.

**ການນຳໃຊ້:**

ໝາກດີບຜ່າກົນແກ່ນ ມີລົດຊາດຫວານ. ສະເພາະແກ່ນແກ່ ແມ່ນໃຊ້ຕົ້ນນຳຫວານກົນ.

**ການກະຈາຍພັນ:** ຕົ້ນໝາກແຕ້ເກີດຕາມປ່າເລົ່າ, ປ່າໂຄກ ແລະ ປ່າດົງ.



ຊື່ຫອງຖິ່ນ: ເຄືອບ້າຍິນ (ໝາກປ້ານວັຍ)

ຊື່ວິທະຍາສາດ: *Entada reticulata* Gagnep

ຕະຫຼາມ: FABACEAE

ລັກສະນະພືດສາດ:

ເຄືອບ້າຍິນເປັນພືດເຄືອ ມີຫົວໃຕ້ດິນ. ໃບປະກອບແບບຂົນນິກ, ໃບຈັບແບບຮຽງສະຫຼັບ,  
ກ້ານໃບມີຂົນ, ໃບຍ່ອຍມີ 8-19 ອູ້, ຈັບແບບກົງກັນຂ້າມ, ໃບຍ່ອຍຮູບຂອບຂະໜານ, 5-15  
ມມ, ກວ້າງ 3-4 ມມ, ກົກໃບມິນ, ປາຍໃບວ້າ ມີຕື່ງໝາມ, ຂອບໃບລູງບ, ໃບສີຂູງ ມີຂົນ  
ທັງສອງດ້ານ, ຂໍ້ດອກແບບຮວງ ມີຂົນ, ດອກສີເຫຼືອງອ່ອນ, ມີຂົນ. ໝາກເປັນຜັກ.

ການນຳໃຊ້:

ຍອດອ່ອນມີລິດຊາດຫວານມັນ ນຳມາແກ່ໄສ່ໜໍ້ໄມ້, ລວກກັບອາຫານ ແລະ ເຮັດຊຸບ.

ການກະຈາຍພັນ: ເຄືອບ້າຍິນ ເກີດຕາມປ່າເລີ່ມ, ປ່າໂຄກ



**ຊື່ຫ້ອງຖິ່ນ:** ບອນຄົ້ນ

**ຊື່ວິທະຍາສາດ:** *Colocasia esculenta* (L.) Schott

**ຕະກຸນ:** ARACEAE

**ລັກສະນະພິດສາດ:**

ບອນຄົ້ນເປັນພິດລົ້ມລຸກ ລຳຕົ້ນສົ່ນເປັນຫົວໃຕ້ດີນ, ມີຢາງໃສ. ໃບຄ່ງວ ຈັບແບບວຽນສະຫຼັບ, ກ້ານໃບອວບນໍ້າ ຍາວ 40-100 ຊມ, ແຜ່ນໃບຮູບຫົວໃຈ, ຍາວ 30-50 ຊມ, ກວ້າງ 13-30 ຊມ, ຂອບໃບລູບ, ປາຍໃບແຫຼມ, ກົກໃບເປັນກາບຫຸ້ມລຳຕົ້ນ, ໃບສີຂຽງ. ຊື່ດອກແບບຕັ້ງອອກຢູ່ຊອກໃບ ຫຼື ປາຍຍອດ, ດອກຈຳນວນຫຼາຍ ບົງດກັນແໜ້ນ ດອກແຍກເයດໃນຊື່ດອກດູງວກັນ, ດອກມີສີຂາວ, ກ້ານຊື່ດອກອວບນໍ້າ ຍາວ 20-30 ຊມ, ມີໃບຊັ້ນດອກໃຫຍ່ສີຂາວ.

**ການນຳໃຊ້:**

ຍອດ ແລະ ກ້ານໃບອ່ອນ ນຳໄປອ່ອມໄສ່ຫັ້ງງົວ ຫຼື ຂຶ້ນໝູ່, ໃບ ແລະ ກ້ານໃບ ນຳໄປຮັດໂອດ ແລ້ວນຳໂອດໄປຕຳແຈ່ວ ເປັນອາຫານພື້ນເມືອງຂອງໄທພວນ. ຢ່າງຕົ້ນບອນ ໃຊ້ຫາຕຸ່ມແມງໄມ້ຕອດ ຂ່ວຍບັນເທິກອາການເຈັບປວດ ແລະ ນຳໄປຫາໄສ່ບ່ອນບົ້ງຫານດາດຂ່ວຍບັນເທິກອາການແຊບຮ້ອນໄດ້. ຫົວໃຕ້ດີນ ນຳມາຟານຕົ້ນກິນ ເປັນຍາດີໄອ.

**ການກະຈາຍພັນ:** ເກີດຕາມແຄນນໍ້າ, ບ່ອນປົງກຊຸ່ມ ຫຼື ບໍລິເວນນໍ້າຂັງ.



ຊື່ຫ້ອງຖິ່ນ: ບອນຫອມ (ບອນເຕີ່ງ)

ຊື່ວິທະຍາສາດ: *Alocasia* sp.

ຜະກຸນ: ARACEAE

ລັກສະນະພືດສາດ:

ບອນເຕີ່ງເປັນພືດລົມລຸກ, ລຳຕົ້ນສັນເປັນຫົວໃຕ້ຕືນ, ມີຢາງໃສ. ໃບດູງວ ຈັບແບບວຽນ ສະຫຼັບ, ກ້ານໃບອວບນັ້ນ ຍາວ 40-60 ຊມ, ແຜ່ນໃບຮູບຫົວໃຈ ຍາວ 20-30 ມ, ກວ້າງ 15-20 ຊມ ມີ, ຂອບໃບລົງບ, ປາຍໃບແຫຼມ, ຮົກໃບວົ້າ, ໃບສີຂຽວ. ຊໍ່ດອກແບບຕັ້ງອອກຢູ່ຊອກໃບ ຫຼື ປາຍຍອດ, ດອກຈຳນວນຫຼາຍບງດກັນແໜ້ນ ດອກແຍກເພດໃນຊໍ່ດອກດູງວກັນ, ດອກສີຂາວ, ກ້ານຊໍ່ດອກວົບນັ້ນ ຍາວ 30-50 ຊມ, ມີເປົ້ອນດອກຂະໜາດໃຫຍ່ສີຂຽວ ອອນ.

ການນຳໃຊ້:

ຍອດອ່ອນນຳມາເຮັດແກງ ຫຼື ອ່ອມ ໄສ່ຂຶ້ນ.

ການກະຈາຍພື້ນ: ເກີດຕາມແຄມນັ້ນ ແລະ ຕິນຜາ.



**ຊື່ຫ້ອງຖິ່ນ:** ຜັກບອນໝາມ (ຜັກໝາມ)

**ຊື່ວິທະຍາສາດ:** *Lasia spinosa* (L.) Thwaites

**ຕະກຸນ:** ARACEAE

**ລັກສະນະພືດສາດ:**

ຜັກໝາມ ພຶດລົມລຸກ ສູງ 50-60 ຊມ, ມີລຳເຫຼົ້າໄຕດິນ ແລະ ກ້ານໃບອວບນໍ້າສີຂຽວ ຫຼື ສີແດງ ມີໝາມແຫຼມແຂງ. ໃບປະກອບແບບນິວມີ ຫຼື ແບບຂົນນິກ, ຈັບແບບລົງສະຫຼັບ, ໃບຍາວ 20-25 ຊມ, ກວາງ 8-10 ຊມ, ຂອບໃບວ້າ, ໃບອ່ອນສີແດງ ເມື່ອແກ່ຈະມີສີຂຽວ ເຫຼືອມ, ເສັ້ນໃບດ້ານລຸ່ມມີໝາມ. ກ້ານຊໍດອກຍາວ 40-70 ຊມ ມີໝາມ, ມີໃບປະດັບໂຄບ ຫຼຸມຊໍດອກ ສິນັການ ບິດກັງວ.

**ການນຳໃຊ້:**

ເອົາຢອດອ່ອນ ແລະ ຊໍດອກອ່ອນ ມາລວກກິນກັບແຈ່ວ, ກັບປິ່ນ ແລະ ຊຸບປະສົມກັບຜັກ ຊະນິດອື່ນ. ເປັນຜັກທີ່ປະຊາຊົນນິຍົມກິນໃນທົ່ວທຸກພາກ ແລະ ຂາຍເປັນສິນຄ້າຕາມ ຕະຫລາດ.

**ການກະຈາຍພັນ:** ພົບໃນທົ່ວປະເທດ ເກີດຕາມແຄມນໍ້າ, ແຄມຫວຍ ແລະ ເຂດທີ່ເປັນດິນຊໍາ.



ຊື່ທັງຖິ່ນ: ບຸ່ນ

ຊື່ວິທະຍາສາດ: *Calamus rhabdocladus* Burret

ຕະກຸນ: ARECACEAE

ລັກສະນະພືດສາດ:

ບຸ່ນເປັນພືດເຄືອ, ທົ່ວລຳຕົ້ນມີໜາມ ໃບປະກອບແບບຂົນນິກ, ຍາວ 1-2 ມ, ໃບຢ່ອຍຮູບແຖບ, ປາຍໃບແຫຼມ, ຂອບໃບລົງບ. ຊື່ດອກເປັນຮວງອອກຢູ່ຊອກໃບ ຫຼື ລຳຕົ້ນ. ໝາກກົມເປືອກເປັນເກັດ.

ການນຳໃຊ້:

ນຳເອົາໜໍ້ອ່ອນມີລິດຊາດຂົມຟາດ ມາປອກເອົາເນື້ອອ່ອນ ແລ້ວນຳໄປອ່ອມກັບຊົນ ແລະ ເອົາໜໍ້ໄປຜົ່າໄຟ ບອກເອົາເນື້ອອ່ອນມາຕຳແຈ່ວ.

ການກະຈາຍພັນ: ເກີດຕາມປ່າດີງ.



ຊື່ຫ້ອງຕົ້ນ: ຜັກບົງ

ຊື່ວິທະຍາສາດ: *Ipomoea aquatica* Forssk.

ຕະກຸນ: CONVOLVULACEAE

ລັກສະນະພືດສາດ:

ຜັກບົງເປັນພືດລົມລຸກ, ລຳຕົ້ນເລີ້ອຕາມໜ້າດິນ, ລຳຕົ້ນເປັນຂຶ້ນໜັງ, ຮາກ ແລະ ໃບອອກ  
ຕາມຂຶ້ນ. ໃບດູງວັຈີບແບບຮຽງສະໜັບ, ກ້ານໃບຢາວ 5-10 ຊມ, ແຜ່ນໃບຮູບທອກ ຫຼື ຮູບ  
ສາມລົງມ, ຍາວ 10-15 ຊມ, ກວ້າງ 5-10 ຊມ, ກົກໃບມິນ ຫຼື ວ້າ, ຂອບໃບລົງບ, ປາຍ  
ໃບແຫຼມ, ໃບສີຂວມມີຢາງສີຂາວ. ດອກດູງວ ຫຼື ເປັນຊໍ່ ອອກຈາກຂອກໄປ, ຮູບລຳໂພງ  
ສີຂາວແກມສົມ່ວງອ່ອນ. ກາບດອກມີ 5 ກາບ ເຊື່ອມຕິດກັນ ສີຂງວ.

ການນຳໃຊ້:

ຍອດອ່ອນມີລິດຊາດຫວານ ນຳໄປຂີ້ວ, ແກງ, ຕົ້ນໃສ່ເຂົ້າປຽກ, ເຂົ້າຊອຍ ແລະ ລວກຊູບ  
ປະສົມກັບກັບຜັກຊະນິດອື່ນງໍ. ຍອດອ່ອນຍັງໃຊ້ເປັນຜັກສົດ ກິນກັບຕຳໝາກຫຼຸງ.

ການກະຈາຍພັນ: ຜັກບົງເກີດຢູ່ປ່ອນຊຸ່ມຊື່ນ, ຕາມທີ່ງນາ, ແຄມໝອງ ຫຼື ຂວ້ຍ ແລະ ຕາມສ່ວນຄົວ.



**ຊື່ຫ້ອງຖິ່ນ:** ບົວຂີ້ແບ

**ຊື່ວິທະຍາສາດ:** *Nymphaea lotus* L.

**ຕະກຸນ:** NYMPHAEACEAE

**ລັກສະນະພືດສາດ:**

ບົວຂີ້ແບເປັນພືດນຳ ມີເຫຼົ້າ ຫຼື ຫົວໄຕດິນ. ໃບດັ່ງວິຕາກອອກຈາກເຫຼົ້າ, ກ້ານໃບອວບນຳ ຍາວ 60-120 ຊມ, ໃບມືນ ເສັ້ນຜ່ານສູນກາງ 25-30 ຊມ, ກົກໃບວ້າ, ຂອບໃບເປັນແຊກ ແຂວເລື່ອຍ, ຜົວໃບດ້ານເທິງເຫຼືອມມັນສີຂຽວ, ດ້ານລຸ່ມສີບົວແກມສີຂຽວອ່ອນ ມີຂຶນ. ດອກ ດັ່ງວ ສີຂາວ, ກາບດອກມີ 4 ກາບ, ກົບດອກມີຈຳນວນຫຼາຍ, ກ້ານດອກຄ້າຍຄືກັບກ້ານໃບ.

**ການນຳໃຊ້:**

ກ້ານໃບ ຫຼື ສາຍບົວນຳເອົາມາປອກ ແກ້ງໃສ່ປາ ຫຼື ຂຶ້ນ ແລະ ຂົວໃສ່ຂຶ້ນ, ສາມາດນຳມາ ກົນເປັນຜັກສິດ ຮັບຕຳໝາກຫຼຸງ ແລະ ອາຫານປະເພດອື່ນໆ ມີລິດຊາດຫວານ.

**ການກະຈາຍພັນ:** ບົວຂີ້ແບເປັນພືດທີ່ເກີດໃນນຳ, ຕາມຫ້ອຍ ແລະ ແນອງຕ່າງໆ.



ຊື່ຫ້ອງຖິ່ນ: ຕົ້ນເບັນ (ເວັນ)

ຊື່ວິທະຍາສາດ: *Flacourtie rukam* Zoll. & Mor.

ຕະກຸມ: SALICACEAE

ລັກສະນະພືດສາດ:

ຕົ້ນເບັນເປັນໄມ້ຢືນ ຕົ້ນສູງ 5-7 ມ, ລຳຕົ້ນອ່ອນມີໜາມ. ໃບດັ່ງວ ຈັບແບບລຽງສະຫຼັບ, ໃບຮູບຂອບຂະໜານ, ຍາວ 8-10 ຊມ, ກວ້າງ 2-4 ຊມ, ກົກໃບມືນ, ຂອບເປັນຕົ້ນ, ປາຍໃບແໜ້ມ, ໃບສີຂຽວເງື່ອມມັນ. ຊໍດອກອອກຕາມຊອກໃບ ດອກສີຂຽວ ຫຼື ສີເງື່ອງອ່ອນ. ໝາກກົມມືນ ສີຂຽວ ເວລາສຸກສີແດງ.

ການນຳໃຊ້:

ໝາກສຸກກົມເປັນໝາກໄມ້ ມີລົດຊາດຫວານ. ໃບອ່ອນນຳມາກົມເປັນຜັກສິດ ກັບອາຫານຕາມຕັ້ງການ.

ການກະຈາຍພັນ: ຕົ້ນເບັນເກີດຕາມປ່າເລົ່າ ແລະ ປ່າໂຄກ.



**ຊື່ຫ້ອງຖິ່ນ:** ເບັນຫັ້າ

**ຊື່ວິທະຍາສາດ:** *Melastoma decemfidum* Roxb. ex Jack.

**ຊື່ຕະກູນ:** MELASTOMATACEAE

**ລັກສະນະພືດສາດ:**

ເບັນຫັ້າເປັນໄມ້ພຸ່ມ ສູງ 60-80 ຊມ, ລຳຕົ້ນກົມ, ກົງງ່າວ່ອນເປັນຫຼູ່ມ. ໃບຄ່ງວ ຈັບແບບ  
ກົງກັນຂ້າມ, ແຜ່ນໃບຮູບຮີ ຫຼື ຮູບຂອບຂະໜານ, ຍາວ 8-16 ຊມ, ກວ້າງ 3-5 ຊມ, ກົກ  
ໃບຮູບຫຼືມ ຫຼື ຮູບມືນ, ຂອບໃບລຽບ, ປາຍໃບແຫຼມ, ຜົວໃບຊາ ມີຂົນສັນກັງສອງດ້ານ. ຊຶ່  
ດອກແບບກະຈຸກ ມີດອກ 1-7 ດອກ, ອອກຢູ່ປາຍຍອດ ແລະ ຕາມງ່າມໃບ, ມີໃບປະດັບຊຶ່  
ດອກຮູບໄຂ່, ມີຂົນ. ດອກສີມ່ວງອ່ອນ, ຖານຮອງດອກຮູບຖ້ວຍ ເຊື່ອມກັນເປັນເຕີ້າໄຂ່, ກົບ  
ດອກມີ 5 ກົບສີມ່ວງອ່ອນ.

**ການນຳໃຊ້:**

ດອກ ແລະ ໝາກສຸກກົມໄດ້. ໃບໃຊ້ຮູດນຳເມືອກອ່ງນກ່ອນນຳໄປປຸງແຕ່ງອາຫານ.

**ການກະຈາຍພັນ:** ເກີດຕາມປ່າໄໂຄກ.



ຊື່ຫອງຖິ່ນ: ຜັກປົ່ງລົ່ງ (ປ່ອງລ່ອງ, ໂພງລົມ)

ຊື່ວິທະຍາສາດ: *Physalis peruviana* L.

ຕະກຸນ: SOLANACEAE

ລັກສະນະພືດສາດ:

ຜັກປົ່ງລົ່ງເປັນພືດລົມລຸກ, ສູງປະມານ 1 ມ ລຳຕົ້ນ ແລະ ກົງງ່າເປັນຮ່ອງສົມ່ວງ ມີຂຶນ. ໃບດັ່ງວ່າ ຈັບແບບກົງກັນຂ້າມ, ກັນໃບ ຍາວ 0,4-1 ຊມ, ແຜ່ນໃບຮູບຫົວໃຈ, ຍາວ 4-12 ຊມ, ກວ້າງ 3-7 ຊມ, ກົກໃບວ້ຳ, ຂອບໃບແບບແຊກແຂວ້ວ, ປາຍໃບແຫຼມ. ດອກດັ່ງວ່າ ອອກຕາມຊອກໄປ, ດອກສີເຫຼືອງ. ໝາກກົມກັງ ສີເຫຼືອງອົມສົມ ໂອບຫຼຸມດ້ວຍກາບດອກ, ມີແກ່ນຫຼາຍ.

ການນຳໃຊ້:

ຍອດອ່ອນນຳມາລວກກົມກັບແຈ່ວ ຫຼື ນຳໄປຊູບປະສົມກັບຜັກຊະນິດຕື່ນງ. ໝາກສຸກມີລົດຊາດສົມຫວານ ກົມໄດ້. ໝົດຕົ້ນ ນຳມາຕົ້ມແຊ່ຕົນເປັນທໍ່.

ການກະຈາຍພັນ: ເກີດຕາມທີ່ງນາ, ແຄມທາງ, ປ່າເຫຼົ່າ ແລະ ຕາມສວນ.



ຊື່ຫ້ອງຖິ່ນ: ໝາກແປ່ມ (ຈະລືງ)

ຊື່ວິທະຍາສາດ: *Garcinia gracilis* Pierre

ຕະກຸນ: CLUSIACEAE

ລັກສະນະພືດສາດ:

ໝາກແປ່ມເປັນໄມ້ຢືນຕົ້ນ ສູງ 6-8 ມ. ໃບດົງວຈຳບແບບກົງກັນຂັ້ນ, ແຜ່ນໃບຮູບຂີ, ກົກໃບຮູງແຫຼມ, ຂອບໃບລົງບ, ປາຍໃບແຫຼມ, ຜົວໃບເຫຼືອມມັນສີຂຽວ. ຊິ່ດອກແບບກະຈຸກ ອອກຢູ່ງ່າມໃບ ຫຼື ບາຍກົງ ສີແດງຊົ່າ. ໝາກກົມມືນສີຂຽວອ່ອນ ເວລາສຸກສີແດງ.

ການນຳໃຊ້:

ຍອດອ່ອນນຳມາກົນກັບແຈ່ວ ແລະ ອາຫານປະເພດອື່ນໆ. ໝາກມີລົດຊາດສົ່ມ ໃຊ້ແກງໄສ່ປາ ແລະ ກົນກັບແຈ່ວເກືອເປັນໝາກສົ່ມ.

ການກະຈາຍພັນ: ເກີດຕາມປ່າເຫຼົ້າ ແລະ ປ່າດົງ.



**ຊື່ຫ້ອງຖິ່ນ:** ຜັກຜີ

**ຊື່ວິທະຍາສາດ:** *Cyperus procerus* Rottb.

**ຕະກຸນ:** CYPERACEAE

**ລັກສະນະພືດສາດ:**

ເປັນພືດລົມລຸກ ສູງ 50-150 ຊມ, ມີເຫຼົງໄຕ້ດິນ, ລຳຕົ້ນອວບເປັນລົງມ ກົກລຳຕົ້ນມີສິນໍາ ຕານເຂັ້ມ. ໃບຮູບແຖບຍາວ 60-120 ຊມ, ກົກໃບເປັນກາບຫຼຸມລຳຕົ້ນ, ຂອບໃບລົງບ, ບາຍ ໃບແຫຼມ. ຂໍ້ດອກຄຸງວ ຫຼື ຂໍ້ດອກປະສົມ ແບບດີ່ວຄັນຮົມ, ອອກຢູ່ປາຍຍອດ, ມີໃບປະດັບຂໍ ດອກ 3-7 ໃບ ຮູບແຖບ, ຍາວ 10-15 ຊມ, ດອກສິນໍາຕານ. ກ້ານຂໍ້ດອກເປັນລົງມ.

**ການນຳໃຊ້:**

ຍອດອ່ອນນຳເອົາມາແກງໃສ່ປາ ແລະ ອ່ອມໃສ່ຊື້ນ.

**ການກະຈາຍພື້ນ:** ຜັກຜີເກີດຕາມແຄມນໍາ, ຕາມບຶງ, ໝອງ ແລະ ບ່ອນມືນໍາຂ້າງ.



**ຊື່ຫ້ອງຖິ່ນ:** ແຜນດິນເຢັນ (ຜັກຫວານຈ້ອຍ)

**ຊື່ວິທະຍາສາດ:** *Scoparia dulcis* L.

**ຕະກຸນ:** SCROPHULARIACEAE

**ລັກສະນະພືດສາດ:**

ຜັກຫວານຈ້ອຍເປັນພືດລົມລຸກ ສູງ 30-50 ຊມ, ລຳຕົ້ນເປັນລ່ຽມມີຂຶນ. ໃບດັງວອອກກັງ  
ເປັນວົງລະ 3 ໃບ, ກັນໃບສັ້ນ, ແຜ່ນໃບຮູບໄຂ່ ຫຼື ຮູບໃບຫອກ, ຍາວ 4-5 ຊມ, ກວາງ  
2-2,5 ຊມ, ກົກໃບມືນ, ຂອບໃບແບບແຊາກແຂວ້ເລື່ອຍ, ປາຍໃບແຫຼມ, ໃບສີຂຽງ. ດອກ  
ດັງວ ຫຼື ຂໍແບບກະຈຸກອອກຢູ່ຢູ່ອດ ແລະ ຕາມງ່າມໃບ, ດອກສີຂາວ.

**ການນຳໃຊ້:**

ນຳເອົາຍອດອ່ອນມາເອາະ ຫຼື ອ່ອມໃສ່ຂຽດ, ມີລິດຊາດຫວານ.

**ການກະຈາຍພັນ:** ແຜນດິນເຢັນເກີດຕາມເດີນຫຍັດ ສວນ ແລະ ປ່ອນທີ່ມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ.



ຊື່ຫ້ອງຖິ່ນ: ພິພວນ (ຝຶດແຍນ)

ຊື່ວິທະຍາສາດ: *Uvaria rufa* Blume

ຕະກຸນ: ANNONACEAE

ລັກສະນະພືດສາດ:

ພິພວນເປັນພືດເຄືອ ຍາວ 2–4 ມ ລຳຕົ້ນກົມ ກິງງ່າວອ່ອນມີຂຶນ. ໃບດູງວົງຈັບແບບ  
ກົງກັນຂ້າມ, ກັນໃບສັນມີຂຶນ. ໃບຮູບໄຂ່ ຫຼື ຮູບຮີ, ຍາວ 4–13 ຊມ, ກວ້າງ 2–5 ຊມ,  
ໂຄນໃບມິນ ຫຼື ຮູບທົ່ວໃຈ, ຂອບໃບລູບ, ບາຍໃບຮຽວແຫຼມ, ແຜນໃບສີຂຽວໜາ ມີຂຶນ. ໃບ  
ປະດັບຊື່ດອກຮູບໄຂ່ ມີ 3–4 ໃບ. ຊື່ດອກອກອກແບບກະຈຸກ, ຢູ່ປາຍຍອດ ແລະ ກິງງ່າ.  
ດອກສີແດງ, ກາບດອກມີ 3 ກາບຮູບໄຂ່ ສີຂຽວອ່ອນ, ມີຂຶນ. ກີບດອກມີ 6 ກີບຮູບໄຂ່  
ສີແດງ. ໝາກເປັນທ່ອນກົມສີຂຽວ ເວລາສຸກສີແດງ.

ການນຳໃຊ້:

ໝາກສຸກກົມເປັນໝາກໄມ້ ມີລົດຊາດຫວານ. ໝາກເອົາມາຕຳປະສົມນຳທາ ແກ້ເຜີນຄັນ.

ເນື້ອໄມ້ ແລະ ຊາກນຳມາຕົ້ນນຳດື່ມ ແກ້ໄຂ້.

ການກະຈາຍພັນ: ພິພວນເກີດຕາມປ່າເລົ່າ, ປ່າດົງ.



**ຊື່ທັງຖິ່ນ:** ຕົ້ນໝາກໄຟ

**ຊື່ວິທະຍາສາດ:** *Baccaurea\_ramiflora* Lour

**ຕະກຸນ:** EUPHORBIACEAE

**ລັກສະນະພືດສາດ:**

ໄມ້ຢືນຕົ້ນ ສູງ 10–15 ມ, ໃບດັ່ງວ ຈັບລົງສະຫຼັບ, ໃບຮູບສ້ວຍ, ຍາວ 10–15 ຊມ, ກວາງ 3–10 ຊມ, ປາຍໃບແຫຼມ, ກົກໃບຮູບຫຼືມ, ຂອບໃບລົງບ, ຜົວໃບດ້ານເທິງສີຂຽວເຊັ້ມ ໃບ ອ່ອນສີແດງ ມີຂົນສັນ. ດອກແຍກເພດ ຕ່າງຕົ້ນ, ຂໍ່ດອກອອກຕາມລຳຕົ້ນ ແລະ ກິ່ງກ່າ, ເປັນຊື່ແບບຮວງຫ້ອຍລົງ. ດອກເພດແມ່ ແລະ ເພດຜູ້ ສີເຫຼືອງແກມສີສົ່ມ ກາບດອກ ມີ 5 ກາບ ຮູບໄຂ່ແຍກກັນ. ໝາກກົມຂຽວ ເວລາສຸກສີແດງ ຫຼື ສີເຫຼືອງ ມີເນື້ອສີຂາວ ແລະ ແກ່ນສີບົວ.

**ການນຳໃຊ້:**

ກົນໝາກສຸກ ທີ່ມີລິດຊາດສົ່ມຫວານ. ຮາກນຳມາຕົ້ມດື່ມ ແກ້ວາການເຈັບກະເພາະ ແລະ ປົວຕັບອັກເສບ.

**ການກະຈາຍພັນ:** ຕົ້ນໝາກໄຟເກີດຕາມປ່າດົງ.



**ຊື່ຫ້ອງຖິ່ນ:** ມັນປ່າ (ມັນລົ່ງມ)

**ຊື່ວິທະຍາສາດ:** *Dioscorea* sp.

**ຕະກຸນ:** DIOSCOREACEAE

**ລັກສະນະພືດສາດ:**

ມັນປ່າເປັນພືດເຄືອ, ມີຫົວໃຕ້ດິນ, ລຳເຄືອອ່ອມເປັນຫລົ່ງມ. ໃບດັ່ງວັຈັບແບບກົງກັນຂ້າມ,  
ໃບຮູບຫົວໃຈ, ກົກໄປວົ້າ, ຂອບໃບລົງບ, ບາຍໃບແຫຼມ, ແຜ່ນໃບສີຂຽວ, ເສັ້ນໃບສີມ່ວງ,  
ກັນໃບຍາວຄົດງ.

**ການນຳໃຊ້:**

ຫົວໃຕ້ດິນນຳມາໜຶ່ງກິນກັບນໍ້າຕານ ຫຼື ຕົ້ມໃສ່ກະທິເຮັດນໍ້າຫວານ.

**ການກະຈາຍພັນ:** ມັນປ່າເກີດຕາມໄກ່ ແລະ ປ່າເລົ່າ.



**ຊື່ທັງຖິ່ນ:** ມັນອື່ມູ້

**ຊື່ວິທະຍາສາດ:** *Dioscorea pentaphylla* L.

**ຕະກຸນ:** DIOSCOREACEAE

**ລັກສະນະພືດສາດ:**

ມັນອື່ມູ້ເປັນພືດເຄືອ ມີຫົວໃຕດິນ ແລະ ຫົວທີ່ອອກຕາມກົງກັນ, ລຳເຄືອມີຂຶນ, ເຄືອສິມ່ວງ. ໃບປະສົມແບບນິ້ວມີ, ໃບກົງກັນຂ້າມ, ໃບຍ່ອຍຮູບໄຂ່ ຫຼື ຮູບຮີ, ໂຄນໃບຮຽວແຫຼມ, ຂອບ ໃບລົງບີ, ປາຍໃບແຫຼມ, ແຜ່ນໃບສີຂຽວ, ເສັ້ນໃບສິມ່ວງ, ກັນໃບຍາວບິດງໍ. ຊໍດອກເປັນ ຮວງຫ້ອຍລົງ, ດອກສີຂາວ.

**ການນຳໃຊ້:**

ຫົວໃຕດິນ ແລະ ຫົວທີ່ອອກຕາມກົງງ່າ ນຳເອົາມາຫຼັງກິນ ແລະ ຕົ້ມນຳຫວານ

**ການກະຈາຍພັນ:** ມັນອື່ມູ້ເກີດຕາມປ່າເລົາ, ປ່າໂຄກ ແລະ ປ່າດົງ.



**ຊື່ຫ້ອງຖິ່ນ:** ໝາກຢາງ (ປະໄລຄູ)

**ຊື່ວິທະຍາສາດ:** *Bousigonia angustifolia* Pierre ex Spire

**ຕະກຸມ:** APOCYNACEAE

**ລັກສະນະພືດສາດ:**

ໝາກຢາງເປັນພືດເລືອ ລໍາກັງງ ທຸກພາກສ່ວນມີຢາງສີຂາວ. ໃບດັ່ງວັນຈັບແບບວົງກັນຂ້າມ, ໃບຮູບຂອບຂະໜານ, ຍາວ 8-13 ຊມ, 3-5 ຊມ, ຂອບໃບລູບ, ປາຍແຫຼມ, ຜົວໃບສີຂຽວເຫຼືອມມັນ, ໃບອ່ອນສີແດງ. ຊໍດອກແບບກະຈ່າງອອກຢູ່ກໍາມໄບ ຫຼື ປາຍກົງ, ດອກສີຂາວ. ໝາກກົມມີນ ສີຂຽວ ເວລາສຸກມີເຫຼືອງ ແລະ ສົ່ມ.

**ການນຳໃຊ້:**

ໝາກສຸກກົມເປັນໝາກໄມ້ ມີລົດຊາດຫວານ.

**ການກະຈາຍພັນ:** ໝາກຢາງເກີດຕາມບໍ່າເລົ່າ ແລະ ປ່າດົງ.



ຊື່ຫ້ອງຖິ່ນ: ຍານາງ

ຊື່ວິທະຍາສາດ: *Tiliacora triandra* (Colebr.) Diels

ຕະກຸມ: MENISPERMACEAE

ລັກສະນະພິດສາດ:

ຢານາງເປັນພິດເຄືອ, ມີຫົວ ຫຼື ເຫຼົ້າໃຕ້ດິນ, ກິງງາຈີສີຂຽວ, ໃບດັງວຈຳບແບບຮູງສະຫຼັບ,  
ໃບຮູບໄຂ່ ຫຼື ຮູບຮົມ, ຍາວ 7-12 ຊມ, ກວ້າງ 3-5 ຊມ, ປາຍໃບແຫຼມ, ຂອບໃບລົງປ, ກົກ  
ໃບມືນ, ເນື້ອໃບໜາ ສີຂຽວເຫຼືອມມັນ. ຂໍດອກແບບຮວງຮ້ອຍລົງ, ອອກຢູ່ປາຍຫອດ ຫຼື  
ຕາມງ່າມໃບ, ດອກນ້ອຍສີເຫຼືອງ, ໝາກມິນກົມສີຂຽວ ເວລາສຸກສີແດງ.

ການນຳໃຊ້:

ໃບນຳມາຍ່ອງໃສ່ນຳ ປະສົມໃສ່ແກ້ງໜໍ້ໄມ້ ແລະ ບຸງແຕ່ງເຮັດອ່ອມແຍ້ ອ່ອມໝາກໝີ. ໃບ  
ນຳໃສ່ນຳດື່ມ ບຳລຸງສຸຂະພາບ, ເປັນຢາແກ້ໄຂ້ ແລະ ຮັອນໃນ. ຮາກນຳມາຕົ້ນນຳດື່ມ ແກ້  
ພິດ ແລະ ແກ້ເບື້ອເມົາ.

ການກະຈາຍພັນ: ຍານາງເກີດຕາມບໍ່ເລົ່າ, ບໍ່ເດີງ ແລະ ຕາມສ່ວນ.



ຊື່ຫ້ອງຖິ່ນ: ຕົ້ນໝາກລໍ່າ

ຊື່ວິທະຍາສາດ: *Adenanthera microsperma* Teijsm. & Binn.

ຕະກຸມ: FABACEAE

ລັກສະນະພືດສາດ:

ຕົ້ນໝາກລໍ່າເປັນໄມ້ຢືນຕົ້ນ ສູງ 8-15 ມ. ໃບປະສົມແບບຂົນນິກ, ໃບຍ່ອຍມີ 8-16 ຊົ້ງ,  
ແຜນໃບຍ່ອຍຮູບທີ່ ຫຼື ຮູບຂອບຂະໜານ ຍາວ 2-5 ຊມ, ກວ້າງ 1-3 ຊມ, ກົກໃບບັງວ,  
ຂອບໃບລົງບ, ບາຍໃບມິນ, ໃບອ່ອນສີແດງ ເວລາແກ່ເລືວສີຂຽວ. ຊຶ່ດອກເປັນຮວງ ຫຼື  
ແບບຫາງກະຮອກ, ອອກຕາມຊອກໃບ. ດອກສີເຫຼືອງອ່ອນ ມີຂົນອ່ອນ. ໝາກເປັນຝັກຮູບ  
ແຖບປິດວູນ.

ການນຳໃຊ້:

ຍອດອ່ອນມີລິດຊາດຝາດມັນ ກົນກັບລາບ ຮັບຢືນ

ການກະຈາຍພັນ: ຕົ້ນໝາກລໍ່າເກີດຕາມປ່າເລົ່າ ແລະ ປ່າດົງ.



**ຊື່ຫ້ອງຖິ່ນ:** ໝາກລື້ນໄມ້

**ຊື່ວິທະຍາສາດ:** *Oroxylum indicum* (L.) Kurz

**ຕະກຸນ:** BIGNONIACEAE

**ລັກສະນະພືດສາດ:**

ເປັນພືດໄມ້ຢືນຕົ້ນ ສູງ 5-10 ມ, ລຳຕົ້ນກົມຊີ ເນື້ອໄມ້ອ່ອນ ແຕກກົງງ່າຂ້ອຍ. ໃບປະສົມ  
ແບບຂົນນິກ ຈັບແບບວົງກັນຂ້າມ, ຍາວ 1-2 ມ, ແຜນໃບຍ່ອຍຮູບໄຂ່ ແກມຮູບຮົກ, ຍາວ  
6-12 ຊມ, ກວ້າງ 4-5 ຊມ.. ດອກເປັນຊໍແບບກະຈ່າງ ມີ 4-10 ດອກ ອອກຢູ່ປາຍຍອດ,  
ກ້ານຊໍດອກຍາວ, ດອກສີເຫຼືອງອົມແດງ, ກາບດອກເປັນຮູບທົ່ວຍ ສີຂຽວອົມແດງ, ກີບດອກ  
ສິມວົງອົມແດງ. ເກສອນຜູ້ມີ 2 ອັນສັນ, 2 ອັນຍາວ ເຊື່ອມຕິດກັບກີບດອກ. ເກສອນແມ່ຍາວ  
ກ່ວາເກສອນຜູ້. ດອກບານຕອນກາງຄືນ ຫຼື ຕອນເຊົ້າ. ໝາກເປັນຜັກແປ ຄ້າຍດາບ ສີຂຽວ  
ເວລາແກ່ເປັນສິນ້າຕານ.

**ການນຳໃຊ້:**

ດອກລວກກັບບຶ່ນ, ກັບແຈ່ວປາແດກ ແລະ ເຮັດອື່ວ, ມີລິດຊາດຂົມ. ໝາກອ່ອນນຳມາເສົາ  
ໄຟ ແລ້ວລອກເບືອກອອກ ກິນກັບລາບ, ກັຍ, ບຶ່ນປາ ແລະ ຍັງນຳໄປຮັດມິກໃສ່ຂົນໜູ້.  
ເບືອກຕົ້ນ ນຳໄປຕົ້ນກົມ ເປັນຍາປົວຕັບ ແລະ ຂຶ້ມາກເຫຼືອງ.

**ການກະຈາຍພັນ:** ໝາກລື້ນໄມ້ເກີດຕາມພື້ນປ່າເລົ່າ, ປ່າໂຄກ ແລະ ປ່າດົງ.



**ຊື່ຫ້ອງຖິ່ນ:** ຜັກເລີາ

**ຊື່ວິທະຍາສາດ:** *Saccharum arundinaceum* Retzius

**ຕະກຸມ:** POACEAE

**ລັກສະນະພື້ນສາດ:**

ຜັກເລີາເປັນພິດລົມລຸກ ສູງ 1-2 ມ, ລຳຕົ້ນກົມ, ບໍລິເວນຂຶ້ແກ່ມີຮາກ. ໃບຮູບແບບ ຍາວ 1-2 ມ, ກວ້າງ 0,5-1,5 ຊມ, ກົກໄໃບເປັນກາບຫຼຸມລຳຕົ້ນ ມີຂົນ, ຂອບໃບລົງບມີຂົນ, ປາຍ ໃບແຫຼມ, ເສັນກາງໃບດ້ານລຸ່ມມີຂົນ. ຂໍ້ດອກແບບຮວງຕັງ, ຂໍ້ດອກອອກຢູ່ປາຍຍອດ, ກ້ານ ຂໍ້ດອກກົມ ສີຂູງວ ຍາວ 40-60 ຊມ, ດອກສີຂາວ

**ການນຳໃຊ້:**

ຍອດອ່ອນນຳເອົາມາແກງໃສ່ໜໍ່ໄມ້ ແລະ ອ່ອມໃສ່ຊື່ນ. ປະຊາຊົນນຳມາຂາຍເປັນສິນຄ້າໃນ ທັງຕະຫລາດ.

**ການກະຈາຍພັນ:** ຜັກເລີາເກີດຕາມແຄມນຳ, ທົ່ງຫຍັງ ແລະ ປ່າເງື່ອງ.



**ຊື່ຫ້ອງຖິ່ນ:** ໝາກເລັບແມວ

**ຊື່ວິທະຍາສາດ:** *Ziziphus oenoplia* (L.) Mill.

**ຕະກຸນ:** RHAMNACEAE

**ລັກສະນະພືດສາດ:**

ໝາກເລັບແມວເປັນພືດເຕີອສູງ 2-4 ມ, ລຳຕົ້ນມີໜາມ. ໃບດັ່ງວ ຈັບແບບຮຽງສະຫຼັບ, ໃບຮູບ  
ຂອບຂະໜານ ຍາວ 1-4 ຊມ, ກວ້າງ 1-3 ຊມ, ກົກໃບມືນ, ຂອບໃບແສກແຂ້ວ, ປາຍໃບ  
ແໜ່ມ ຫຼື ຕິ່ງໜາມ. ຂໍ້ອກອກແບບກະຈຸກ ຕາມງ່າມໃບ, ດອກສີເຫຼືອງ, ກາບດອກເປັນ  
ຈານ ປາຍແຍກເປັນ 5 ແຊກມີຂຶນ, ກົບດອກມີ 5 ກົບ ຮູບບ່ວງ ສີຂູງວອ່ອນ. ໝາກກົມມືນ  
ສີຂູງວ ເວລາສຸກສີດຳ.

**ການນຳໃຊ້:**

ໝາກສຸກກົມເປັນໝາກໄມ້ ມີລົດຊາດຫວາມ. ລຳເຕືອນນຳມາຕົ້ມນຳຕົ້ມ ເປັນຢາພອກເລືອດ  
ຮັດໃຫ້ເລືອດລົມມາດີ.

**ການກະຈາຍພັນ:** ໝາກເລັບແມວເກີດຕາມປ່າເລົາ ແລະ ປ່າໂຄກ.



ຊື່ຫ້ອງຖິ່ນ: ຜັກແວ່ນ

ຊື່ວິທະຍາສາດ: *Marsilea quadrifolia* L.

ຕະກຸນ: MARSILEACEAE

ລັກສະນະພືດສາດ:

ຜັກແວ່ນເປັນພືດຈັດໃນກຸ່ມຜັກກຸດ ເລີ່ມຍາວຕາມໜ້າດິນ ມີຫຼາຍເຫຼົງຈີ້ ແລະ ຮາກ. ໃບເກີດ  
ຈາກເຫຼົງຈີ້, ມີກ້ານໃບຢາວ 10-15 ຊມ ອວບນໍ້າ, ກົກກັນໃບແກ່ມີສະບູ. ໃບແບບປະສົມ,  
ມີ 4 ແຜ່ນໃບຢ່ອຍຮູບສາມລົງມ, ປາຍມືນ, ກົກໃບແຫຼມ ເຊື້ອມຕິດກັນ, ໃບສີຂຽວອ່ອນ.

ການນຳໃຊ້:

ຍອດອ່ອນນຳເອົາມາກິນກັບຢືນ, ກັບແຈ່ວໜໍ້ໄມ້ສົມ ແລະ ຊຸບໜໍ້ໄມ້. ນອກຈາກນັ້ນຍັງນຳມາ  
ລວກຊູບ ຫຼື ນຳໄປຊູບປະສົມໃສ່ກັບຜັກຊະນິດອື່ນ.

ການກະຈາຍພັນ: ຜັກແວ່ນເກີດທີ່ວປະເທດ ຕາມທີ່ງນາບ່ອນປົງກຸຫຸ່ມ ຫຼື ບ່ອນທີ່ມີນຳຂັ້ງ.



**ຊື່ຫ້ອງຖິ່ນ:** ໝາກຫວດນ້ອຍ

**ຊື່ວິທະຍາສາດ:** *Lepisanthes rubiginosa* (Roxb.) Leenh.

**ຕະກຸນ:** SAPINDACEAE

**ລັກສະນະພືດສາດ:**

ເປັນໄມ້ພຸ່ມສູງ 50-100 ມ. ໃບປະກອບແບບຂົນນິກ, ໃບຍ່ອຍມີ 3-6 ສູ່, ແຜນໃບຮູບໄຂ້  
ບັນ, ຍາວ 3-30 ຊມ, ກວ້າງ 2-11 ຊມ, ກົກໃບຮຽວ, ຂອບໃບລົງບ, ປາຍໃບແຫຼມ, ໃບ  
ສີຂຽວ ຜົວໃບຊາ. ຊຳດອກຕັ້ງແບບກະຈ່າງອອກຢູ່ປາຍຍອດ ຫຼື ງໍາມໃບ, ດອກສີເງື່ອງອ່ອນ.  
ໝາກຮູບກົມສ້ວຍຫົວ ແລະ ຫາງ ໝາກອ່ອນສີຂຽວ ເລາສຸກສີເງື່ອງ ກາຍເປັນແດງ.

**ການນຳໃຊ້:**

ໝາກສຸກກົມເປັນໝາກໄມ້ ມີລິດຊາດຫວານ. ອາກຕົ້ນໝາກຫວດ ນຳມາບອງເຫຼົ້າດື່ມ  
ເປັນປາບໍາລຸງຮ່າງກາຍ.

**ການກະຈາຍພັນ:** ເກີດຢູ່ໃນປ່າເລື່ອ ແລະ ປ່າດົງ.



**ຊື່ຫັກຖິ່ນ:** ຫວາຍຂົມ

**ຊື່ວິທະຍາສາດ:** *Calamus viminalis* Wild.

**ຕະກຸນ:** ARECACEAE

**ລັກສະນະພິດສາດ:**

ຫວາຍຂົມເປັນພິດເຄືອ, ລຳຕົ້ນສີຂຽວແຕກກຳ, ມີກາບໃບຫຼຸມລຳຕົ້ນສີຂຽວ ແລະ ມີໝາມ. ໃບປະກອບແບບຂົນນິກາຍຈາວ 1-2 ມ, ໃບຍ່ອຍ ມີ 20–50 ໃບ ຈັບແບບກົງກັນຂ້າມ, ໃບຍ່ອຍຮູບແຖບ, ກົກໃບແຫຼມ, ຂອບໃບມີໝາມ, ປາຍໃບແຫຼມ. ຊຶ່ດອກເປັນແບບຮວງອອກຢູ່ງໆມາກາບໃບ ຫຼື ລຳຕົ້ນ. ໝາກກົມ ເປືອກໝາກເປັນເວັດ.

**ການນຳໃຊ້:**

ໜຶ່ນອ່ອນນຳເອົາມາປອກເອົາຍອດ ແລ້ວນຳໄປເອະະ ຫຼື ອ່ອມ ໄສ່ຊື້ນ, ອີກວິທີນິ່ງແມ່ນນຳເອົານຳໄປເຜົາໄຍ້ໃຫ້ສຸກ ປອກເອົາຍອດອ່ອນມາຕຳແຈ່ວ. ໝາກຫວາຍສູກກິນໄດ້ ມີລົດຊາດຫວາມ.

**ການກະຈາຍພັນ:** ຫວາຍຂົມເກີດຕາມປ່າດົງ.



**ຊື່ຫ້ອງຖິ່ນ:** ຜັກຫວາມກັ້ານຕົງ

**ຊື່ວິທະຍາສາດ:** *Colubrina pubescens* Kurz.

**ຕະກຸນ:** RHAMNACEAE

**ລັກສະນະພືດສາດ:**

ຜັກຫວາມກັ້ານຕົງເປັນພືດໝຸ່ມ ສູງ 2-3 ມ. ໃບດັງວົຈັບແບບຮຽງສະຫຼັບ, ໃບຮູບໄຂ່, ກີກໃບມືນ, ຂອບໃບແບບແຊກແຂວ້ເລື່ອຍ, ປາຍໃບແຫຼມ, ຜົວໃບສີຂຽວເຫຼືອມ. ຊຳດອກແບບກະຈຸກ ອອກຢູ່ຕາມງ່າມໃບ. ດອກສີເຫຼືອງອ່ອນ. ພາກກົມສີຂຽວເປັນຮ່ອງ ເວລາສຸກ ສີດຳ.

**ການນຳໃຊ້:**

ຍອດອ່ອນນຳມາລວກກົມກັບອາຫານ ແລະ ແກ້ໄສ່ໜໍມັນ, ໄສ່ຊື້ນ ຫຼື ປາ. ນອກນັ້ນຍັງນຳເອົາຍອດອ່ອນໄປປະກອບໃສ່ເອາະ ແລະ ອ່ອມຊື້ນ ຫຼື ປາ.

**ການກະຈາຍພັນ:** ຜັກຫວາມກັ້ານຕົງເກີດຕາມປ່າເລົ່າ.



ຊື່ຫ້ອງຖິ່ນ: ຜັກຫວາມເຄືອ (ຜັກຫວານດົງ)

ຊື່ວິທະຍາສາດ: *Smilax* sp.

ຕະກຸນ: SMILACACEAE

ລັກສະນະພິດສາດ:

ຜັກຫວາມເຄືອເປັນພິດເຄືອ ມີມີເກາະ. ໃບດູງວ ຈັບແບບຮຽງສະຫຼັບ, ແຜນໃບຮູບໄຂ່ ຫຼື ຮູບຫົວໃຈ ຍາວ 3-6 ຊມ, ກວ້າງ 3-4 ຊມ, ກົກໃບມືນ, ຂອບໃບລົງບ, ປາຍໃບແຫຼມ, ແຜນ ໃບ ພາລັກຫວາມເຄືອ ແລະ ກອບ, ຜົວໃບດ້ານເທິງສີຂຽວເຫຼືອມມັນ, ຜົວໃບດ້ານລຸ່ມສີຂຽວອົມສີ ເທິງ, ເສັ້ນໃບມີ 5 ເສັ້ນ. ຂໍ້ດອກແບບກະຈຸກ ອອກຢູ່ງ່າມໃປ. ໝາກມີນກົມສີຂຽວ ເວລາສຸກ ສີແດງ.

ການນຳໃຊ້:

ຍອດອ່ອນນຳມາລວກກົມກັບປິນ, ກັບແຈ່ວ ແລະ ເຮັດຊູບ, ມີລົດຊາດຫວານ.

ການກະຈາຍພັນ: ຜັກຫວາມເຄືອເກີດຕາມບ່າເລົ່າ, ບ່າດົງ.



ຊື່ທັງຖິ່ນ: ຫຼຸງລົງ

ຊື່ວິທະຍາສາດ: *Hymenocardia punctata* Wall. ex Lindl.

ຕະກຸນ: PHYLLANTHACEAE

ລັກສະນະພືດສາດ:

ຫຼຸງລົງເປັນພືດຝູ່ມ ສູງ 2-3 ມ, ເປົອກລຳຕົ້ນລົງບ ສີນຳຕານ, ມີຢາງໃສ. ໃບດັ່ງວ ຈັບແບບ  
ຮຽງສະຫຼັບ, ແຜນໃບຮູບໄຂ່ ຫຼື ຮູບຮີ, ຍາວ 2-7 ຊມ, ກວ້າງ 1-3 ຊມ, ກົກໃບມືນ, ຂອບ  
ໃບລົງບ, ປາຍໃບມືນ, ໃບສີຂຽວກັງເປັນມັນ, ແຜນໃບດ້ານລຸ່ມມີຂົນ ແລະ ຕ່ອມ, ເສັ້ນກາງ  
ໃບ ແລະ ເສັ້ນໃບມີຂົນໜາ. ດອກແຍກເພດຕ່າງຕົ້ນ ຂໍ້ດອກເປັນຮວງ ອອກຕາມກົງງ່າ ຫຼື  
ງ່າມໃບ. ດອກສີແດງອົມສິມວົງ. ພາກແປຮູບທົວໃຈ.

ການນຳໃຊ້:

ໝາກມີລິດຊາດສົ່ມ ນຳມາກິນກັບປິນ, ກັບລາບ ແລະ ອາຫານປະເພດອື່ນງ.

ການກະຈາຍພັນ: ຫຼຸງລົງເກີດຕາມປ່າເລົ່າ ແລະ ປ່າໂຄກ ແຂດດິນທາມ.



**ຊື່ຫ້ອງຖິ່ນ:** ຜັກທີມຂຶ້ງວົວ

**ຊື່ວິທະຍາສາດ:** *Amaranthus viridis L.*

**ຕະກຸນ:** AMARANTHACEAE

**ລັກສະນະພືດສາດ:**

ຜັກທີມຂຶ້ງວົວເປັນພືດລົ້ມລູກ ສູງ 30-50 ຊມ, ລຳຕົ້ນກົມ ໃບດົງວຈັບແບບລົງສະຫຼັບ, ມີກັນໃບຍາວ 5-10 ຊມ, ແຜ່ນໃບຮູບໄຂ່, ຍາວ 3-6 ຊມ, ກວ້າງ 2-4 ຊມ, ກົກໃບແຫຼມ ຫຼືມິນ, ຂອບໃບເປັນຄື້ນ, ປາຍໃບແຫຼມ, ໃບສີຂຽວ, ຕາມເສັ້ນໃບມີຂົນອ່ອນນຸ່ມ. ຊົ່ວໂກແບບຮອງຕັ້ງແຈບຍາວ 5-12 ຊມ, ອອກຢູ່ປາຍຍອດ ຫຼື ຕາມງ່າມໃປ. ດອກແຍກເພດ ຮ່ວມຕົ້ນ, ດອກຢ່ອຍນ້ອຍຂຽວ ຫຼື ສິມວົງ.

**ການນຳໃຊ້:**

ຍອດອ່ອນນຳເອົາມາແກງ ຫຼື ລວກກິນກັບແຈ່ວ, ກັບປິ່ນ, ກັບເຮົາະ ແລະ ນຳໄປຊູບປະສົມ ກັບຜັກຊະນິດອື່ນໆ.

**ການກະຈາຍພັນ:** ຜັກທີມຂຶ້ງວົວເກີດຕາມທີ່ງນາ, ຕາມສວນ ແລະ ເດີນຫຍັງ



**ຊື່ຫ້ອງຖິ່ນ:** ຜັກທິມໝາມ

**ຊື່ວິທະຍາສາດ:** *Amaranthus spinosus L.*

**ຕະກຸນ:** AMARANTHACEAE

**ລັກສະນະພືດສາດ:**

ຜັກທິມໝາມເປັນພິດລົ້ມລູກ ສູງ 30-90 ຊມ, ມີລຳຕົ້ນ ແລະ ກົງກັນກົມກັງ ມີໝາມຢູ່  
ຕາມຂຶ້ນ. ໃບດັ່ງວ່າ ຈັບແບບລົງສະຫຼັບ, ກົງກັນໃບຍາວມີໝາມ, ໃບຮູບຫອກ ຍາວ 3-5  
ຊມ, ກວາງ 1-2 ຊມ, ກົກ ແລະ ປາຍໃບແຫຼມ, ຂອບໃບເປັນຕົ້ນ, ໃບສີຂຽວ ໃບອ່ອນມີ  
ຂົນ. ຊື່ດອກເປັນແບບຮວງຕັ້ງ. ດອກແຍກເພດຮ່ວມຕົ້ນ, ອອກກູ່ຢູ່ອດ ແລະ ຕາມຊອກ  
ໃບ, ດອກນັ້ອຍສີຂຽວ.

**ການນຳໃຊ້:**

ຍອດອ່ອນນຳມາຂົວໃສ່ຂົນ ແລະ ແກງໃສ່ຂົນ ຫຼື ປາ, ລວກຊຸບປະສົມກັບຜັກຊະນິດ ອືນງ  
ມີລົດຊາດຫວານ ປະຊາຊົນລາວມັກນີຍົມກົມ ແລະ ເກັບຂາຍໃນຫ້ອງຕະຫລາດ.

**ການກະຈາຍພັນ:** ເກີດທົ່ວໄປ ຕາມທົງນາ, ຕາມສວນ ແລະ ເດີນຫຍັງ.



**ຊື່ຫ້ອງຖິ່ນ:** ຫົວດຸກເດືອ

**ຊື່ວິທະຍາສາດ:** *Amorphophallus paeoniifolius* (Dennst.) Nicolson

**ຕະກຸນ:** ARACEAE


**ລັກສະນະພືດສາດ:**

ຫົວດຸກເດືອເປັນພິດລົມລຸກ, ລຳຕົ້ນສັນເປັນຫົວໃຕ້ດີນ, ມີຢາງໃສ. ໃບປະສົມແບບຂົນນິກ, ກ້ານໃບຍາວ 60-70 ຊມ ສີຂູງວ ມີຈຸດລາຍດຳຂູງວ, ໃບຍ່ອຍຮູບຂອບຂະໜານ ຫຼື ຮູບຮົ. ຂໍ ດອກແບບຮວງຕັ້ງ ຍາວ 5-10 ຊມ, ດອກແຍກເພັດ ໃນຊໍດອກຄຸງວຽກັນ, ດອກນັ້ອຍມີຈຳ ນວນໝາຍ, ມີໃບຊ້ອນດອກຮູບຮົ ໂອບຫຼຸມຊໍດອກສີຂູງວ.

**ການນຳໃຊ້:**

ນໍາຍອດອ່ອນນຳມາແກງ ຫຼື ອ່ອມໄສ່ຊື່ນ. ຫົວໃຊ້ຕົ້ນກິນ ເປັນຍາປົວໄຂ້ຢູ່ງ.

**ການກະຈາຍພັນ:** ຫົວດຸກເດືອເກີດຕາມແຄມໝອງນຳ, ແຄມຫ້ວຍ ແລະ ເຂດດິນຊຸ່ມຊື່ນ.



ຊື່ຫ້ອງຖິ່ນ: ໝາກຫຼວດ

ຊື່ວິທະຍາສາດ: *Elaeagnus latifolia* L.

ຕະກຸນ: ELAEAGNACEAE

ລັກສະນະພື້ນສາດ:

ໝາກລອດເປັນໄມ້ເຄືອ ລຳຕົ້ນມີເກົດສີເຫຼາ ຫຼື ສີຂາວ. ໃບຄ່ງວ ຈັບແບບຮຽງສະຫຼັບ, ໃບຮູບຮີ ຫຼື ຮູບຫອກ ຍາວ 6-12 ຊມ, ກວ້າງ 3-4 ຊມ, ກົກໃບຮຽວ, ຂອບໃບລົງປ, ປາຍໃບແຫຼມ, ຜົວໃບດ້ານເທິງສີຂຽວເຫຼືອມ, ທ້ອງຜົວໃບສິນໍາຕານ. ດອກອອກເປັນກະຈຸກຢູ່ຊອກ ໃບ, ດອກສີເຫຼືອງ. ໝາກສຸກຮູບກົມຍາວ ສີແດງມີຈຸດສີຂາວ.

ການນຳໃຊ້:

ໝາກສຸກກົມເປັນໝາກໄມ້ ມີລົດຊາດສົ່ມຫວານ ແລະ ກົມເປັນໝາກສົ່ມກັບແຈ່ວ.

ການກະຈາຍພັນ: ໝາກລອດເກີດຕາມປ່າດົງ ແລະ ແຄມຫ້ວຍ.



**ຊື່ຫ້ອງຖິ່ນ:** ຜັກທຳທຳ (ຍານຮັງຈາງ, ບັວງ)

**ຊື່ວິທະຍາສາດ:** *Passiflora foetida* L.

**ຕະກຸນ:** PASSIFLORACEAE

**ລັກສະນະພິດສາດ:**

ຜັກທຳທຳເປັນພິດເຄືອ, ມີມີເກາະ, ກົງງ່າວອ່ອນມີຂົນ. ໃບດຸງວ ແລະ ເປັນ 3 ແສກມີຂົນ, ຍາວ 6-8 ຊມ, ກວ້າງ 4-6 ຊມ, ກົກໄປວົ້າ, ຂອບໃບເປັນແຊກແຂວເລື່ອຍມີຂົນ, ປາຍໃປແຫຼມ, ໃບສີຂູງວ ໃບອ່ອນມີຂົນ. ດອກດຸງວ ອອກຢູ່ງ່າມໃບ ຫຼື ປາຍກົງ. ດອກສີຂາວບິນສີບິວ. ກາບດອກເປັນແຊກເສັ້ນຝອຍຄ້າຍຂົນ. ກົບດອກສີຂາວກົກກົບສີບິວ ມີເສັ້ນຝ່ອຍຈຳນວນ ຫຼາຍ. ໝາກກົມສີຂູງວ ມີເສັ້ນຝອຍໂອບຫຼຸມ.

**ການນຳໃຊ້:**

ຍອດອ່ອນ ແລະ ດອກ ນຳມາລວກກົມກັບປິນ ແລະ ລວກປະສົມກັບຜັກຊະນິດຕື່ນໆ. ໝາກສຸກນຳມາກົມເປັນຂອງຫວານໄດ້.

**ການກະຈາຍພັນ:** ຜັກທຳທຳເກີດຕາມປ່າເລົ່າ ແລະ ແຄມນຳ.



**ຊື່ຫ້ອງຖິ່ນ:** ຜັກໝອກ

**ຊື່ວິທະຍາສາດ:** *Centella asiatica* (L.) Urb.

**ຕະກຸນ:** APIACEAE

**ລັກສະນະພືດສາດ:**

ຜັກໝອກເປັນພືດລົມລຸກ ລຳຕົ້ນເປັນເຄືອ ເລືອຕາມໜ້າດິນ. ໃບດັ່ງວ ເກີດເປັນກຸ່ມ ແຕ່ 1 ເຕິງ 10 ໃບ, ກ້ານໃບຍາວ 3-10 ຊມ, ແຜນໃບຮູບໄຂໜັງ ຍາວ 1-3 ຊມ, ກວ້າງ 1-4 ຊມ ກົກໃບວ້າ, ຂອບໃບເປັນເຄື້ນ, ປາຍໃບມືນ, ໃບສີຂູງວ. ຊື່ດອກແບບກະຈຸກນ້ອຍ, ອອກຢູ່ກົກ ກ້ານໃບ ຫຼື ຕາມຂຶ້ນ. ດອກສີຂາວ ຫຼື ສີມ່ວງ.

ໝາກນ້ອຍຮູບໄຂໜັງ.

**ການນຳໃຊ້:**

ກິນໄດ້ ທຸກພາກສ່ວນ, ກິນເປັນຜັກສົດ ກັບປິນ, ລາບ, ເອາະ ແລະ ພັນແນນມເຂົ້າ ຫຼື ລວກກິນ ຫຼື ເຮັດຊູບປະສົມກັບຜັກຊະນິດອື່ນງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຜັກໝອກຍັງນຳມາຄັ້ນ ຫຼື ບັນເປັນເຄື້ອງດືມ ແລະ ນຳຜັກໝອກ ຢັງເປັນຢາບໍາລຸງສຸຂະພາບ ແລະ ເປັນຢາແກ້ໄຂ້, ແກ້ວກາເສບ, ແກ້ວການຮັອນໃນ ແລະ ເປັນຢາເຢັນ.

**ການກະຈາຍພັນ:** ຜັກໝອກເກີດທົ່ວໄປ ເກີດທຸກໆພາກໃນທົ່ວປະເທດລາວ

**ເກີດຕາມບ່ອນຊຸ່ມເຊັ່ນ:** ຫົງນາ, ແຄມຫ້ວຍ, ແຄມໜອງ ແລະ ຕາມສວນຄົວ.



**ຊື່ຫ້ອງຖິ່ນ:** ເຄືອໝໍນ້ອຍ (ໝາກນ້ອຍ)

**ຊື່ວິທະຍາສາດ:** *Cyclea barbata* Miers

**ຕະກຸນ:** MENISPERMACEAE

**ລັກສະນະພືດສາດ:**

ໝໍນ້ອຍເປັນພືດເຄືອ, ລຳຕົ້ນ ແລະ ກີ່ງ່າສີຂຽງມີຂຶນ. ໃບດັ່ງວ່າ ຈັບແບບຮູງສະຫຼັບ, ກ້ານ  
ໃບຈັບຢູ່ຫ້ອງແຜ່ນໃບ, ກ້ານໃບຍາວ 3-4 ຊມ. ແຜນໃບຮູບຫົວໃຈ ຫຼື ຮູບສາມຫຼົງມ, ຍາວ  
6-17 ຊມ, ກວ້າງ 4-12 ຊມ, ປາຍໃບແຫຼມ, ຂອບໃບລົງບ, ກົກໃບຕັດ ຫຼື ມິນ, ໃບສີຂຽງ  
ມີຂຶນຊາ. ຂໍ້ດອກແບບກະຈຸກ, ອອກຕາມລຳເຄືອ ປາຍຍອດ ຫຼື ງໍາມໃບ, ດອກສີຂາວ.

**ການນຳໃຊ້:**

ໃບລັງສະອາດ ນຳມາຍ່ອງໃສ່ນັ້ນ ແລ້ວຕອງເອົາວຸນໄປປະສົມກັບບິນປາ, ເປັນອາຫານ  
ພື້ນເມືອງ ປະຊາຊົນລາວນິຍົມກິນ. ວຸນທີ່ຕົ້ນຈາກໝໍນ້ອຍ ຍັງນຳໄປເຮັດນັ້ນຫວານ ແລະ  
ນັ້ນໝໍນ້ອຍ. ວຸນຈາກໝໍນ້ອຍ ແລະ ອາກໝໍນ້ອຍນຳມາແຊ່ໜັ້ນກິນ ເປັນຢາເຢັ່ນ ແກ້ວການ  
ຮອນໃນ.

**ການກະຈາຍພັນ:** ເຄືອໝໍນ້ອຍເກີດຕາມປ່າເລົ່າ, ປ່າໂຄກ, ປ່າດົງ ແລະ ຕາມສ່ວນ.



ຊື່ຫ້ອງຖິ່ນ: ຕົ້ນໝາກເໝີ້າ

ຊື່ວິທະຍາສາດ: *Antidesma acidum* Retz

ຕະກຸນ: PHYLLANTHACEAE

ລັກສະນະພືດສາດ:

ໄມ້ພຸ່ມ ສູງ 2–4 ມ ກຳງ່າວ່ອມມີຂົນສັນ. ໃບຄ່ງວ ຈັບແບບລຽງສະຫຼັບ, ກັນໃບມີຂົນ, ແຜນໃບຮູບໄຂໜັນ, ຍາວ 3-8 ຊມ, ກວ້າງ 1-3 ຊມ, ກົກໃບຮູບລື່ມ, ຂອບໃບລຽບ, ປາຍ ໃບຮຽວແບມ, ໃບສີຂຽວໝາ ມີຂົນທັງສອງດ້ານ. ຂໍດອກເປັນຮວງ ອອກຢູ່ຕາມງ່າມໃບ ແລະ ປາຍກຳງ່າວ. ໃບປະດັບຊໍດອກມີ 3-4 ໃບ, ຮູບຫອກມີຂົນສັນ. ດອກແຍກເພດຕ່າງຕົ້ນ, ດອກສີເຫຼືອງ. ໝາກຮູບໄຂ່ ສີຂຽວ ເວລາສຸກສີແດງ ມີເນື້ອອວບນຳ.

ການນຳໃຊ້:

ໝາກສຸກກົມເປັນໝາກໄມ້ ມີລົດຊາດຫວານ. ໃບ ແລະ ໝາກ ນຳມາຕົ້ມນຳອາບແກ້ອາການ ເລືອດຈາງ ຫຼື ໂຕເຫຼືອງ ເລືອດໄໝວູນບໍ່ສະດວກ. ໃບນຳມາຕຳໂພະ ແກ້ອາການເຈັບຫົວ ແລະ ປົວໄລກຜິວໜັງ. ຕົ້ນ ແລະ ສາກ ນຳມາຕົ້ມນຳດື່ມ ບໍາລຸງໄຂ່ຫຼັງ, ຂັບ ຢ່ວ, ດີລົງ ຂາວ ແລະ ປົວໝົດລູກ.

ການກະຈາຍພັນ: ຕົ້ນໝາກເໝີ້າເກີດຕາມພື້ນປ່າໄຕກ ແລະ ປ່າດົງ.



ຊື່ຫອງຖິ່ນ: ຜັກອີງກະເທບ (ຜັກກູດເລື້ອ)

ຊື່ວິທະຍາສາດ: *Selaginella eurynota* A. Braun.

ຕະກຸນ: SELAGINELLACEAE

ລັກສະນະພື້ນສາດ:

ຜັກອີງກະເທບຈັດໃນກຸມຜັກກູດ ເລືອຕາມໜ້າດິນ ຫຼື ເກະຕາມພະລານ, ແຕກກົງກ້ານລົງງ  
ສະຫຼັບແຜນພູງງຽວ, ໃບເປັນເວັດນອຍໆ ຈັບລົງງສະຫຼັບກຳນົບເປັນຄູ່, ໃບຮູບຂອບຂະໜານ  
ຍາວ 1-2 ມມ, ປາຍໃບແຫຼມ, ກົກໃບບັງວ, ຂອບໃບລົງບ, ແຜນໃບເບື້ອງເທິງສີຂູວເຂັ້ມ,  
ດ້ານລຸ່ມສີຂູວອ່ອນ.

ການນຳໃຊ້:

ນຳເອົາຍອດອ່ອນມາລວກຊູບ ແລະ ເຮັດແກງໃສ່ຊື້ນ. ເປັນພື້ນ ນຳມາບຸກເປັນໄມ້ປະດັບໄດ້.

ການກະຈາຍພື້ນ: ຜັກອີງກະເທບເກີດຕາມແຄມນຳ ແລະ ພື້ນປ່າດົງ ບ່ອນຊຸ່ມຊື້ນ.



ຊື່ຫ້ອງຖິ່ນ: ເຄືອອື່ທິກາ

ຊື່ວິທະຍາສາດ: *Olax imbricata* Roxb.

ຕະກຸນ: OLACACEAE

ລັກສະນະພືດສາດ:

ເຄືອອື່ທິກາ ເປັນພືດເຄືອ, ລຳອ່ອນກົມສີຂຽວ ລາຍດຳ, ໃບດັງວ ຈັບແບບຮູງສະຫຼັບ, ໃບຮູບ  
ກົມສວຍ, ຍາວ 5-9 ຊມ, ກວ້າງ 2-3 ຊມ, ກົກໃບມືນ, ຂອບໃບລົງບ, ປາຍໃບແຫຼມ. ຊໍ  
ດອກອວກແບບກະຈຸກ, ມີ 5-10 ດອກ, ອອກຢູ່ງ່າມໄປ ແລະ ປາຍກົງ. ດອກ ສີຂາວ ຫຼື ສີ  
ໄຂ, ບໍ່ມີກັນດອກ ກາບດອກເຊື່ອມຕິດກັນ ເປັນຮູບທົວຍ, ສີຂຽວອ່ອນ. ກົບດອກມີ 5 ກົບ  
ສີຂາວ. ໝາກອ່ອນຮູບກົມສີໄຂ ເວລາສຸກສີສົມ.

ການນຳໃຊ້:

ຍອດອ່ອນມີລິດຊາດຂຶມອ່ອນ ນຳມາກິນເປັນຜັກສິດ ກັບລາບ, ກັບກົອຍ ແລະ ອາຫານ  
ປະເພດອື່ນໆ.

ການກະຈາຍພັນ: ເຄືອອື່ທິກາ ມັກເກີດຕາມພື້ນທີ່ປ່າໄໂຄກ.



**ຊື່ຫ້ອງຕົ້ນ:** ຜັກອີເລີດ

**ຊື່ວິທະຍາສາດ:** *Piper sarmentosum Roxb*

**ຕະກຸນ:** PIPERACEAE

**ລັກສະນະພືດສາດ:**

ຜັກອີເລີດເປັນພືດລົມລຸກ ສູງ 30-80 ຊມ, ລຳຕົ້ນກົມ ທຸກພາກສ່ວນຂອງຕົ້ນມີກົນທອມ. ໃບດັ່ງວ ຈັບແບບລົງສະຫຼັບ, ກ້ານໃບຍາວ, ໃບຮູບທິວໃຈ, ຍາວ 7-16 ຊມ, ກວ້າງ 5-10 ຊມ, ເສັ້ນກ່າງໃບມີ 5-7 ເສັ້ນ, ກົກໃບຕັດ ຫຼື ມິນ, ຂອບໃບລົງປ, ບາຍໃບແຫຼມ, ໃບສີຂຽວ ຜົວໃບມັນເງື້ອມ. ຊື່ດອກແບບຮວງຫ້ອຍລົງ ຫຼື ຮວງຕັ້ງແຈບ, ອອກຢູ່ຢອດ ແລະ ຕາມງົມ ໃປ, ດອກແຍກເພດຮ່ວມຕົ້ນ, ດອກສີຂາວ.

**ການນຳໃຊ້:**

ໃບມີກົນທອມ ລົດຊາດເຜົດໜ້ອຍໜຶ່ງ ໃບນຳເອົາມາແກງໃສ່ຊັ້ນ ແລະ ເພີຍງົວ ຫຼື ຄວາຍ, ໃບສິດນຳມາເປັນຜັກພັນໝັງງ, ພັນປາ ແລະ ອາຫານປະເພດພັນອື່ນໆ, ທາງພາກໄຕ ສອຍຜັກອີເລີດຕຳໃສ່ໝາກມ່ວງ ມີລົດຊາດດີ. ຮາກໃຊ້ຕົ້ນນຳດື່ມ ເປັນຢາປົວເປົາຫວານ ແລະ ຂັບໄລ່ລົມໃນກະເພາະ.

**ການກະຈາຍພັນ:** ເກີດຕາມສວນ, ບ່ອນປຸກຊຸມ, ກ້ອງຕົ້ນໄມ້ບ່ອນຮົ່ມ ແລະ ຕາມພື້ນປ່າດົງ.



**ຊື່ຫ້ອງຖິ່ນ:** ຜັກວິລວກ

**ຊື່ວິທະຍາສາດ:** *Pseudodracontium harmandii* Engl.

**ຕະກຸນ:** ARACEAE

**ລັກສະນະພື້ນສາດ:**

ຜັກວິລວກເປັນພື້ນລົມລູກ ສູງ 80 ຊມ, ມີຫົວໃຕ້ດິນ. ໃບປະສົມ, ກ້ານໃບສີຂຽວ ມີຈຸດລາຍສີດຳ ຍາວ 60-70 ຊມ, ໃບຍ່ອຍ ຮູບຂອບຂະໜານ ຫຼື ຮູບຮີ. ໃບປະດັບຊໍ່ດອກ ຮູບຮີໄອບຫຼຸມຊໍ, ຊໍ່ດອກແບບຮວງຕັງ ຍາວ 5-10 ຊມ, ດອກແຍກເພີດໃນຊໍ່ດອກດູງວກັນ, ດອກນ້ອຍສີຂາວ ມີຈຳນວນຫຼາຍ ແລະ ມີກິ່ນເໝັນ.

**ການນຳໃຊ້:**

ເອົາກ້ານໃບອ່ອນມາລອກເປື້ອກອອກ ນຳໄປອ່ອມ ຫຼື ແກງໃສ່ຊີ້ນ. ສ່ວນຫົວນຳມາບົດ ຫຼື ຂຸດໃສ່ຟີ ແກ້ວບັນເທົາອາການເຈັບປວດ.

**ການກະຈາຍພັນ:** ເກີດຕາມປ່າໄຕກໍ່ວໄປ.



**ຊື່ຫ້ອງຖິ່ນ:** ຕົ້ນໝາກເຕີກ

**ຊື່ວິທະຍາສາດ:** *Solanum stramonifolium* Jacq.

**ຕະກຸນ:** SOLANACEAE

**ລັກສະນະພື້ນສາດ:**

ຕົ້ນໝາກເຕີກເປັນພື້ນຝຸ່ມ ສູງ 50-100 ຊມ, ລຳຕົ້ນ ແລະ ກົງກ້ານມີໜາມ, ບຸກພາກສ່ວນມີຂົນປົກຄຸມ. ໃບດັງວຈັບແບບຮຽງສະຫຼັບ, ຮູບໄຂ່ ຍາວ 20-30 ຊມ, ກວ້າງ 15-20 ຊມ, ກົກ ໃບວ້າ ຫຼື ຕັດ, ຂອບໃບວ້າ ຫຼື ເປັນເຄື່ອນ, ບາຍໃບແຫຼມ, ໃບສີຂຽວຊາມມີຂົນທັງສອງດ້ານ, ຕາມເສັ້ນກາງໃບມີໜາມ. ຊື່ດອກແບບກະຈຸກ ອອກຢູ່ງ່າມໃບ, ດອກສີຂາວ, ກາບດອກສີຂຽວ ມີຂົນ, ກົບດອກສີຂາວ ມີຂົນ. ໝາກມີນກົມສີຂຽວ ເວລາສຸກສີເຫຼື້ອງ ມີຂົນກາບດອກຕິດທຶນ, ແກ່ນແປມີຈຳນວນຫຼາຍ.

**ການນຳໃຊ້:**

ໝາກມີລົດຊາດສົ່ມ ນຳມາຈີ່ຕຳແຈ່ວ ແລະ ໝາກສີດ ນຳໄປປະກອບໃສ່ຕຳໝາກຫຼຸງ ມີລົດ ຊາດດີ.

**ການກະຈາຍພັນ:** ໝາກເອີກເກີດໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີແສງແດດ ຕາມສ່ວນຄົວ, ຕາມເດືອນ ບັນ, ແຄມຫາງ ແລະ ຕາມປ່າເລົ່າ.



**ຊື່ຫ້ອງຖິ່ນ:** ຜັກຮານດູ້ງ

**ຊື່ວິທະຍາສາດ:** *Oenanthe javanica* (Blume) DC.

**ຕະກຸນ:** APIACEAE

**ລັກສະນະພືດສາດ:**

ຜັກຮານດູ້ງ ເປັນພືດລົມລຸກ ສູງ 30-60 ຊມ, ລຳຕິ່ນເປັນຮ່ອງຕາມລວງຍາວຂອງລຳ. ໃບປະກອບແບບຂຶນນິກ, ໃບຢ່ອຍຮູບໄຂ່ ກວາງ 2-5 ມມ, ຍາວ 1-6 ຊມ, ກົກໃບບັງວ, ຂອບໃບແບບແຂວ້ເລື້ອຍ, ບາຍໃບແຫຼມ, ໃບສີຂຽວອ່ອນ. ຊົ່ວໂມງແບບດີວັດັນຮືມ, ດອກມີຈຳນວນຫຼາຍ, ດອກສີຂາວ, ກາບດອກມີ 5 ກາບ, ແກສອນຜູ້ມີ 5 ອັນ. ໝາກເວລາແກ່ຈະແຕກອອກເປັນສອງສ່ວນ.

**ການນຳໃຊ້:**

ຢອດອ່ອນ ນຳມາລວກກິນກັບແຈ່ວ ແລະ ອາຫານປະເພດອື່ນໆ. ນອກຈາກນັ້ນຍັງນຳໄປລວກຊຸບປະສົມກັບຜັກຊະນິດອື່ນໆ.

**ການກະຈາຍພັນ:** ເກີດໃນບ່ອນຊຸ່ມ, ຕາມຊຳ ຫຼື ບ່ອນນໍ້າຂັງ.



ຊື່ຫ້ອງຖິ່ນ: ຜັກໄຮ

ຊື່ວິທະຍາສາດ: *Ficus* sp.

ຕະກຸມ: MORACEAE

ລັກສະນະພືດສາດ:

ຜັກໄຮ ເປັນໄມ້ຢືນຕົ້ນ ສູງ 7-10 ມ, ເປົ້ອກລຳຕົ້ນສິນໍາຕາມ, ທຸກພາກສ່ວນມີຢາງສີຂາວ. ໃບດັ່ງວິຈັບກັງວ່າງນ, ໃບຮູບກົມສ້ວຍ, ກົກໃບວໍ້າ ຫຼື ຮູບຕັດ, ຂອບໃບລົງບ, ປາຍໃບແຫຼມ, ຜົວໃບສີຂຽວ ເວລາຍັງອ່ອນສີແດງ. ພາກກົມ ສີຂຽວ.

ການນຳໃຊ້:

ໃບອ່ອນນຳກົມເປັນຜັກສິດກັບລາບ, ກັບກົອຍ, ພັນແໜມປາ, ພັນບັນແສ່ວ ແລະ ສາມາດ ກົນເປັນຜັກສິດກັບອາຫານປະເພດອື່ນໆ. ຜັກໄຮເປັນສິນຄ້ານຳມາຊາຍຕາມຕະຫຼາດຫ້ອງຖິ່ນ ໃນເຂດພາກໄຕ້.

ການກະຈາຍພັນ: ຜັກໄຮມີກາເກີດຕາມບ່າດົງ ແລະ ບ່າໂຄກ.



## ເອກະສານອ້າງອີງ

ຄໍາເຫັນ ໄຊດາລາ ແລະ ວິຈິດ ລໍາໄຊ, 2000. **ເຕືອງປ່າຂອງດົງທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນ ສປປລາວ.** ໂຮງພິມ ແຫ່ງລັດ, ວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.

ໄຊມອນ ກາດເນີ, ພິດາ ສີລິສູນທອນ, ວິໄລວອນ ອະນຸສາສຸກທອນ, 2549. **ຕົ້ນໄມ້ເມືອງເໜີອຂອງ ປະເທດໄທ.** ໂຄງການຈັດພິມຄົບໄຟ, ກຸງເທບ, ປະເທດໄທ.

ວິຈິດ ລໍາໄຊ, 2001. **ການສຶກສາອະນຸກົມວິຖານຂອງໄມ້ດອກໃນເຂດປ່າສະຫງວນຫ້ວຍຍາງກຳແພງ ນະຄອນວຽງຈັນ.** ວິທະຍານີພົນປະອິນຍາມະໜາບັນດີດ ສາຂາຊີວະວິທະຍາ, ບັນດີດ ວິທະຍາໄລ, ມະໜາວິທະຍາໄລຂອນແກ່ນ, ປະເທດໄທ.

Callaghan, M., 2004. **Checklist of Lao Plant Names.** Vientiane, Laos PDR.

FAO. 2008. **Country Report on The State Of Plant Genetic Resources For Food And Agriculture.** Food and Agriculture Organization of the United Nations.

Inthakoun, L. and Delang, C.O., 2008. **A Checklist of plants found in Lao PDR with scientific and vernacular names.** Lulu Enterprises Inc. 860 Aviation Parkway, Suite 300, Morrisville, NC 27560.

Joost Foppes., 2008. **Fish, frogs and forest vegetables:** Role of wild products in human nutrition and food security in Lao PDR. IUCN.

Joost, F., and Ketphanh, S., 2004. **NTFP use and household food security in Lao PDR.** Forest Research Centre (FRC) and SNV, the Netherlands Development Organization. paper prepared for the NAFRI/FAO EM-1093 Symposium on “Biodiversity for Food Security”, Vientiane, 14-10-2004.

Gisella, S., Cruz-Garcia and Lisa, L. P., 2011. **Ethnobotanical investigation of ‘wild’ food plants used by rice farmers in Kalasin,** Northeast Thailand. Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine. 7:33.

Lehmann, L., Greijmans, M. and Shenman, D., 2003. **Forests and Trees of the Central Highlands of Xieng Khouang, Lao P.D.R.** Lao Tree seed project, Natural Resources and Environment Programme, Vientiane, Lao. PDR.

Maxwell, J., 2000. **Vegetation in the Seephandon Wetland, Lao PDR.** Naturel History Bulletin Siam Society. 48: 47-93.

Newman, M., Svengsuksa B. and Lamxay, V., 2006. **Selected Resources for Plant Identification in Lao PDR.** Royal Botanic Garden Edinburgh, Sisawath Printing, Vientiane, Lao PDR.

- Pham Thi, K. T., Le Phuoc, C. and Nguyen Thi, K. Y., 2013. **Biodiversity indices and utilization of edible wild plants: a case study of the Cham Island in Quang Nam Province, Vietnam.** Journal of Research in Environmental Science and Toxicology (ISSN: 2315-5698) Vol. 2(9) pp. 167-174,
- Martin, G., Sounthone, K., Vichith, L. And Khamphone, S., 2007. **Non Timber Forest Products in Lao PDR.** The National and Forestry Research Institute, Lao PDR.
- Newman, M., Ketphanh, S., Svengsuksa, B., Thomas, P., Sengdala. K., Lamxay, V. and K. Armstrong., 2007. **A Checklist of the vascular plants of Lao PDR.** IUCN Laos, Royal Botanic Garden Edinburgh, Darwin Initiative, Edinburgh, Scotland.
- Phangsintham, P. and Ninh, T., 1999. Botany. **A Wildlife and Habitat Survey of Hin Namno National Biodiversity Conservation Area and Adjacent Areas, Khammouane Province, Lao PDR.** Vinton, M. and Walston, J. Reprot. p.74
- Roger, M., Chanthone, P. and & Sonsai, K., 2004. **Seasonally Flooded Habitat and Non-Timber Forest Products: Supporting Biodiversity and Local Livelihoods in Southern Lao PDR.** WWF Lao Program with Living Aquatic Resources Research Center (LARReC) and the Livestock and Fishery Section of Savannakhet Province.
- Vidal, J. 1959. **Noms Vernaculaires de Plantes (Lao, Mèo, Kha) en Usage au Laos.** Extrait du Bulletin de l'Ecole Francaise d'Etrême-Orient, Tome XLIX, fascicule 2, Paris, France.
- Yoshitaka, T. and Nguyen, V. K., 2007. **Edible Wild Plants of Vietnam.**

## ດែនសម្រាប់ខ្លួន

ខ្លួន	លេខា
ការចូរទៅរាជរដ្ឋបាល	5
ការចូរទៅរាជរដ្ឋបាល	6
ការសាប (ផ័ត៌មាន)	7
ការយោង (ផ័ត៌មាន)	8
ការទូទៅ (ផ័ត៌មាន), ខ្លួន (ធមាត្រា)	9
ការគុណភាព (ផ័ត៌មាន), វាទាមព័ត៌មាន (ផ័ត៌មាន), តាមរយៈលើកទីនៃ	10
ការពិនិត្យ	11
ការធ្វើឯកសារ	12
ការធ្វើឯកសារ	13
ការណិតរាយ (ផ័ត៌មាន), (ផ័ត៌មានរាយការណ៍រាយ)	14
ការបញ្ជី (ផ័ត៌មាន)	15
ក្នុង (ផ័ត៌មាន)	16
ក្នុង (ផ័ត៌មាន)	17
ក្នុង (ផ័ត៌មាន)	18
ក្នុង (ផ័ត៌មាន)	19
ក្រុមហ៊ុន	20
ក្រុមហ៊ុន (ផ័ត៌មាន), បំបាត់បំបាត់ (ផ័ត៌មាន), ឯកសារ (ផ័ត៌មាន)	21
ការរក (ធមាត្រា)	22
ការយក (តិច)	23
ខ្លួន (ផ័ត៌មាន), សម្រាប់ (ផ័ត៌មាន)	24
ខ្លួន, ខ្លួន (តិច)	25
ខ្លួន	26
ខ្លួន (បច្ចនាល)	27
ខ្លួន	28
ខ្លួន (ពិនិត្យ)	29
ខ្លួន (ធមាត្រា), ក្រុមហ៊ុន (ធមាត្រា)	30
ទីតាំង (ផ័ត៌មាន)	31
ទីតាំង	32
ទីតាំង (ធមាត្រា), ធមាត្រា (ធមាត្រា)	33
ទីតាំង (ពិនិត្យ)	34

ແຄ	35
ຄອນແຄນ (ປະຍົງ)	36
ຕາດ (ຜັກ)	37
ເຄັງ (ໝາກ)	38
ແຕງຟົ້າ (ໝາກ)	39
ຈອງ (ຜັກ), ຕ້າງຕີບ	40
ສະເມັກ	41
ສັນ, ປຸ່ສະເມັກ	42
ສອບແສບ (ໄປເລາະ)	43
ສົ່ມ (ຜັກ) ຕາກົງ (ຜັກ), ບົງກື (ຜັກ)	44
ສົ່ມຂຶ້ມ້ອນ	45
ສົ່ມປ່ອຍ, ຍະໄລ້, ສະຫວາດ	46
ສົ່ມຝຳ	47
ສົ່ມຝິດ	48
ສົ່ມນຳ	49
ສົ່ມລົມ	50
ສົ່ມໄກ່ຍ	51
ສົມແສງ, ຕົ້ນແສງ	52
ສັງ (ຜັກ), ແກ້ວ (ຜັກ)	53
ໄສ (ຜັກ)	54
ໄສຕັນ (ເຄືອ)	55
ຊອຍຈຳ (ຜັກ)	56
ຊາຍຊູ້	57
ດາງຂົມ (ຜັກ)	58
ເຕື່ອກັງງ (ໝາກ)	59
ຕ້ອງ (ໝາກ)	60
ຕາວຄົນ	61
ຕົວສົ່ມ	62
ຕົນລົດ, ເຮືອເຫາະ (ຜັກ)	63
ຕົນຮູ້ງ (ຜັກ)	64
ຕຸບໝູບ (ຫວ້ານ)	65
ຕຸມ (ໝາກ)	66
ຕີບ (ຜັກ)	67

ແຕ້ (ໝາກ)	68
ບັດບິນ (ເຄືອ), ບັນຍອຍ (ໝາກ)	69
ບອນຄົນ	70
ບອນຫອມ, ບອນເຕື່ອ	71
ບອນໝາມ (ຜັກ), ໝາມ (ຜັກ)	72
ບຸນ	73
ບົງ (ຜັກ)	74
ບົວຂີ້ແບ້	75
ເບັນ (ຕົ້ນ), ເຮັນ	76
ເບັນອ້າ	77
ປ່ຽງລົງ (ຜັກ), ປ່ອງລ່ອງ, ໂພງລົມ	78
ແປ່ມ (ໝາກ), ຈະລືງ	79
ຜີ	80
ແຜນດິນເຢັນ, ຫວານຈ້ອຍ (ຜັກ)	81
ພິພວນ (ພິດແຍນ)	82
ໄຟ (ໝາກ)	83
ມັນປ່າດ, ມັນລົງມ	84
ມັນອື່ນ	85
ຢາງ (ໝາກ), ປະໄລສູງ	86
ຢານາງ	87
ລໍ່າ	88
ລົ້ນໄມ້ (ໝາກ)	89
ເລີ່າ	90
ເລັບແມວ (ໝາກ)	91
ແວນ (ຜັກ)	92
ຫວດນ້ອຍ (ໝາກ)	93
ຫວາຍຂົມ	94
ຫວານກ້ານຕົງ (ຜັກ)	95
ຫວານເຄືອ (ຜັກ), ຫວານດົງ (ຜັກ)	96
ຫຼົງລົງ	97
ຫົມຂີ້ງວົວ (ຜັກ)	98
ຫົມໝາມ (ຜັກ)	99
ຫົວດຸກເດືອ	100

ឃ្លុន (ធមាត្រ)	101
ខ័ំខាំ (ដៅរ), យានទ្វាក់, ប៉ោង	102
ឈមុក (ដៅរ)	103
ខំនីមួយ, ធមានីមួយ	104
ឈើឱ្យ (ធមាត្រ)	105
ធន្ទុរាជហេប (ដៅរ), ភ្នែកលើឯ (ដៅរ)	106
ធន្ទិរាជ (ត្រឹន)	107
ធន្ទិលិន (ដៅរ)	108
ធន្ទិលូរក (ដៅរ)	109
ធន្ទិរក (ធមាត្រ)	110
ធន្ទាមត្បី (ដៅរ)	111
ធន្ទេ (ដៅរ)	112

## តំណែងនិងខ្លួនិភ័យសាធារណៈ

ខ្លួនិភ័យសាធារណៈ	ចម្ងាយ
<i>Acacia concinna</i> (Willd.) DC.	46
<i>Adenanthera microsperma</i> Teijsm. & Binn.	88
<i>Adenia viridiflora</i> Craib.	7
<i>Aegle marmelos</i> (L.) Corrêa	66
<i>Afzelia xylocarpa</i> (Kurz) Craib	68
<i>Aganonerion polymorphum</i> Pierre ex Spire	50
<i>Alocasia</i> sp.	71
<i>Alpinia bracteata</i> Roxburgh	26
<i>Alpinia conchigera</i> Griff	25
<i>Alternanthera sessilis</i> (L.) A.DC.	10
<i>Amaranthus spinosus</i> L.	99
<i>Amaranthus viridis</i> L.	98
<i>Amorphophallus paeoniifolius</i> (Dennst.) Nicolson	100
<i>Ampelocissus</i> sp.	51
<i>Amphineurion marginatum</i> (Roxb.) D.J.Middleton	55
<i>Antidesma acidum</i> Retz	105
<i>Azadirachta indica</i> A. Juss.	29
<i>Baccaurea ramiflora</i> Lour	83
<i>Barringtonia acutangula</i> (L.) Gaertn.	12
<i>Blainvillea acmella</i> (L.) Philipson.	37
<i>Bousigonia angustifolia</i> Pierre ex Spire	86
<i>Caesalpinia mimosoides</i> Lam.	8
<i>Calamus rhabdocephalus</i> Burret	73
<i>Calamus viminalis</i> Wild.	94
<i>Capparis zeylanica</i> L.	57
<i>Careya sphaerica</i> Roxb.	13
<i>Centella asiatica</i> (L.) Urb.	103
<i>Colocasia esculenta</i> (L.) Schott	70
<i>Colubrina pubescens</i> Kurz.	95
<i>Commelinia diffusa</i> Burm. f.	15
<i>Connarus semidecandrus</i> Jack	43

<i>Conyza albida</i> Willd. ex Spreng.	56
<i>Crassocephalum crepidioides</i> (Benth.). S. Moore	63
<i>Crateva magna</i> (Lour.) DC.	16
<i>Cratoxylum formosum</i> (Jack) Dyer	62
<i>Croton</i> sp.	34
<i>Curcuma angustifolia</i> Roxb	6
<i>Curcuma</i> sp.	5
<i>Cyclea barbata</i> Miers	104
<i>Cyperus procerus</i> Rottb.	80
<i>Dialium cochinchinense</i> Pierre.	38
<i>Dillenia indica</i> L.	42
<i>Dioscorea hispida</i> Dennst.	23
<i>Dioscorea pentaphylla</i> L.	85
<i>Dioscorea</i> sp.	84
<i>Diospyros chevalieri</i> Lecomte	30
<i>Donax cannaeformis</i> (G.Forst.) K.Schum.	31
<i>Dracaena angustifolia</i> Roxb.	36
<i>Elaeagnus latifolia</i> L.	101
<i>Embelia ribes</i> Burm.f.	45
<i>Entada reticulata</i> Gagnep	69
<i>Ficus racemosa</i> L.	59
<i>Ficus</i> sp.	112
<i>Flacourtia rukam</i> Zoll. & Mor.	76
<i>Garcinia gracilis</i> Pierre	79
<i>Gleichenia</i> sp.	18
<i>Glinus oppositifolius</i> (L.) DC.	58
<i>Glochidion brunneum</i> Hook.f.	40
<i>Gymnopetalum cochinchinense</i> (Lour.) Kurz.	9
<i>Helminthostachys zeylanica</i> (L.) Hook.	64
<i>Hymenocardia punctata</i> Wall. ex Lindl.	97
<i>Ipomoea aquatica</i> Forssk.	74
<i>Kaempferia rotunda</i> L.	65
<i>Lasia spinosa</i> (L.) Thwaites	72
<i>Lepisanthes rubiginosa</i> (Roxb.) Leenh.	93


<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit.	11
<i>Limnocharis flava</i> (L.) Buchenau	19
<i>Limnophila geoffrayi</i> Bonati	24
<i>Markhamia stipulata</i> (Wall.) Seem. ex K.Schum.	35
<i>Marsilea quadrifolia</i> L.	92
<i>Melastoma decemfidium</i> Roxb. ex Jack.	77
<i>Momordica charantia</i> L.	54
<i>Monochoria cyanea</i> F. Muell.	21
<i>Monochoria hastata</i> (L.) Solms	67
<i>Musa paradisiaca</i> L.	20
<i>Nephelium hypoleucum</i> Kurz.	33
<i>Nymphaea lotus</i> L.	75
<i>Oenanthe javanica</i> (Blume) DC.	111
<i>Olax imbricata</i> Roxb.	107
<i>Oroxylum indicum</i> (L.) Kurz	89
<i>Passiflora foetida</i> L.	102
<i>Peperomia pellucida</i> (L.) Kunth	53
<i>Phyllanthus emblica</i> L.	28
<i>Physalis peruviana</i> L.	78
<i>Piper sarmentosum</i> Roxb	108
<i>Portulaca oleracea</i> L.	44
<i>Pseudodracontium harmandii</i> Engl.	109
<i>Pteridium aquilinum</i> var. <i>esculentum</i> (G.Forst.) Kuhn.	17
<i>Rhus chinensis</i> Mill.	48
<i>Rorippa indica</i> (L.) Hiern	14
<i>Saccharum arundinaceum</i> Retzius	90
<i>Sandoricum koetjape</i> (Burm. f.) Merr.	60
<i>Schleichera oleosa</i> (Lour.) Oken.	32
<i>Scoparia dulcis</i> L.	81
<i>Selaginella eurynota</i> A. Braun.	106
<i>Smilax</i> sp.	96
<i>Solanum stramonifolium</i> Jacq.	110
<i>Solanum torvum</i> Sw.	39
<i>Spondias pinnata</i> (L.f.) Kurz	22

<i>Streblus asper</i> Lour	47
<i>Syzygium antisepticum</i> (Blume) Merr. & L.M.Perry	41
<i>Terminalia chebula</i> Retz.	49
<i>Tiliacora triandra</i> (Colebr.) Diels	87
<i>Uvaria rufa</i> Blume	82
<i>Wallichia gracilis</i> Becc.	61
<i>Xanthophyllum flavescens</i> Roxb.	52
<i>Zingiber</i> sp.	27
<i>Ziziphus oenoplia</i> (L.) Mill.	91


## ໄຄງສ້າງຂອງແຜ່ນໃບ




## ປະເພດຂອງໃບ




## ການຈັບຂອງໃບ




## ປາຍໃບ




## ກົກໃບ



ຊົ່ວໂລກ



ໂຄງສ້າງຂອງດອກ



## ປະເທດຂອງມາກ



ໂຄງສ້າງຂອງມາກ

